

152

VANHAESSENDONCK

FLORE DES ENVIRONS D'ANVERS

R GDL

18

BEL

403

JARDIN BOTANIQUE  
DE L'ÉTAT





**PRODROME**

**DE LA FLORE**

**DES ENVIRONS D'ANVERS**

**ET D'UNE PARTIE DE LA CAMPINE.**

fl. belge

152

THIRD

# DE LA FLORE

DES ENVIRONS D'ANTWERP

ET D'UNE PARTIE DE LA CAMPAGNE.



PRODROME

# DE LA FLORE

DES ENVIRONS D'ANVERS

ET D'UNE PARTIE DE LA CAMPINE;

Par G. Constant Vanhaesendonck,

MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE D'ANVERS, ETC.  
A TONGERLOO.



BRUXELLES,

SOCIÉTÉ ENCYCLOGRAPHIQUE DES SCIENCES MÉDICALES,  
RUE DE FLANDRE, 155.

—  
1841.



# PRODROME

## DE LA FLORE DES ENVIRONS D'ANVERS

ET D'UNE PARTIE DE LA CAMPINE;

---

### AVANT-PROPOS.

---

La province d'Anvers est une des plus riches de la Belgique sous le rapport des productions végétales. Malgré ses richesses, elle a été rarement explorée par des botanistes qui ont encore plus rarement communiqué le résultat de leurs recherches au public.

Ces motifs m'ont engagé à publier cette notice dans l'espoir d'exciter nos botanophiles à pousser leurs recherches avec ardeur. Alors nous serons bientôt en possession d'une Flore complète de notre province.

Les ouvrages publiés sur cette matière sont au nombre de trois :

1° *Statistique du département des Deux-Nèthes, publiée par M. d'Herbouville, préfet, an X de la République.* (1802-1803.) Toute la partie qui traite de l'histoire naturelle est due au professeur Dekin; sept cents espèces y sont indiquées.

2° *Relation d'une promenade botanique faite dans la Campine au mois de juillet 1852; par J. Kickx, Bruxelles, 1853, in-8°.* Il a paru une réimpression augmentée en 1853, sous le titre : *Relation d'une promenade botanique et agricole dans la Campine.*

3° *Flore de la province d'Anvers*, par Van Beneden et Teurlinckx, publiée dans le *Dictionnaire géographique de la province d'Anvers*, par Ph. Vandermaelen, Bruxelles, 1854, in-8°, huit cents espèces y sont mentionnées.

Dans la classification des plantes de ce prodrôme, j'ai pris pour guide le système sexuel de Linné. Ce système est non-seulement le plus facile et le

mieux connu, mais il a toujours été enseigné à l'école de médecine d'Anvers. Comme j'ai l'intention de donner plus de développement au présent Mémoire et d'en faire une Flore descriptive de notre province, je me propose de faire usage d'une classification proposée par M. le professeur Kickx, et qui n'a pas encore été employée.

Dans la rédaction de ce catalogue, j'ai tâché d'être aussi régulier que possible : j'ai pris pour base ; 1<sup>o</sup> celui de Dekin ; 2<sup>o</sup> celui de MM. Van Beneden et Teurlinckx ; 3<sup>o</sup> les plantes qui ont échappé aux recherches de Dekin ; 4<sup>o</sup> celles de M. Kickx ; 5<sup>o</sup> enfin celles que j'y ai ajoutées ainsi que celles que mon ami M. Westendorp, médecin au 1<sup>er</sup> régiment d'artillerie a découvertes pendant son séjour au camp de Beverloo, en 1858.

Le peu de loisir dont j'ai pu disposer fera voir que le nombre des végétaux découverts a considérablement augmenté en peu de temps (1). Ce nombre aurait été infiniment plus considérable si je n'avais pas été empêché de faire des excursions botaniques.

Je me trouve heureux de pouvoir exprimer ici ma reconnaissance à M. le professeur Kickx, pour les soins et les bons conseils que j'ai reçus de lui pendant mes études ; à M. Dumortier qui a eu la bonté de me donner des éclaircissements sur quelques difficultés et qui m'a offert ses ouvrages sur la botanique. Je dois également des remerciements à M. Sommé pour l'extrême obligeance avec laquelle il a mis sa bibliothèque à ma disposition. Enfin je cite les noms des personnes qui ont eu la complaisance de me faire parvenir des plantes.

#### SIGNES POUR DÉSIGNER LA DURÉE DES PLANTES.

- ① Plante annuelle.
- ② — bisannuelle.
- ③ — vivace.
- ④ — Arbres, arbrisseaux et sous-arbrisseaux.

#### MONANDRIE MONOGYNIE.

1. *Hippuris vulgaris* L., commune dans les eaux claires et stagnantes dans le Poldre de *Austruweel* et dans le canal *Heren-thals* entre *Berchem* et *Borgerhout* (Dk.) ②. 5—8.
2. *Salicornia herbacea* L., non Ehrh., croit dans les endroits dénudés et sablonneux le long de l'Escaut (Dk.) et dans le Poldre inondé à la Tête de Flandre (nobis.) ①. 8—9.

(1) J'aurais pu encore augmenter le nombre des plantes de ce prodrôme en y ajoutant les *Équisetacées*, les *Rhizospermées*, les *Fougères* et les *Lycopodiées* comme l'ont fait Dekin et MM. Van Beneden et Teurlinckx. Ces plantes appartiennent d'ailleurs à la cryptogamie et sont déjà décrites dans la Flore cryptogamique des environs de Louvain, par M. Kickx.



MONANDRIE DIGYNIE.

3. *Callitriche verna* L., dans les eaux claires et stagnantes (Dk.)  $\beta$ . *isophylla* Bluff et Finger. Croît dans les fossés des prés entre Berchem et Borgerhout (nobis) ①. 4—9.
4. *Callitriche autumnalis* L., cette espèce est très-commune dans les mêmes localités (Dk.) ①. 8—10.

DIANDRIE MONOGYNIE.

3. *Ligustrum vulgare* L., cultivé pour former des haies aux alentours des jardins (Dk.), croît aussi à l'état spontané dans les dunes entre Ostende et Nieuport (nobis) ②. 6—7.
6. *Circea lutetiana* L., *C. Vulgaris* Moenik. Dans les bois couverts et humides aux environs de Wilryck (Dk.) et dans la forêt de Tongerlo dans la Campine (nob.) ④. 6—8.
7. *Verbena officinalis* L., le long des chemins entre Austruweel et Eeckeren, et sur la digue de l'Escaut, près du fort du nord (Dk.) ①. 6—9.
8. *Veronica agrestis* L., les champs cultivés près de Berchem et Deurne; assez commune (Dk.) ①. 4—6.
9. *Veronica hederæfolia* L., croît partout dans les champs humides et les jardins potagers (Dk.) ①. 4—6.
10. *Veronica triphyllos* L., *V. digitata* Lam. fl. fr. dans les champs cultivés de Borgerhout et de Deurne, et dans la Campine ou cette espèce est assez rare (Dk.) ①. 4—5.
11. *Veronica arvensis* L., *V. acinifolia* Willd. non L. dans les champs cultivés sous Berchem (Dk.) ①. 3—8.
12. *Veronica serpyllifolia* L., croît dans les lieux sablonneux et humides de la Campine, (Dk.) Ainsi que dans les prés, près de la lunette de Herenthals, ④. 5—10.
13. *Veronica verna* L., *V. pinatifida* Lam. J. II. dans les champs sablonneux (Dk.) ①. 4—5.
14. *Veronica Beccabunga* L., les fossés et ruisseaux aux environs de Berchem (Dk.) ④. 6—9.
15. *Veronica Anagallis* L., dans les eaux claires et stagnantes aux environs de Deurne et dans le canal de Herenthals sous Borgerhout (Dk.) ①. 6—9.
16. *Veronica scutellata*, dans les endroits où l'eau a séjourné pendant l'hiver, (Dk.) dans les mares aux environs de Westerloo et de Gheel, nous l'avons trouvé également, mais en petit nombre, sur les bords des fossés dans les prés non loin de la lunette Herenthals (nob.) ④. 7—8.
17. *Veronica Chamedrys* L., dans les lieux ombragés et sur les bords des fossés assez commune partout (Dk.) ④. 5—7.
18. *Veronica Buxbaumii*, Tenor *V. persica*, Poir; cette belle

espèce croit le long des fossés dans le bois de Tongerlo où elle est très-rare (nob.) 24. 5—7.

19. *Veronica Teucrium* L., dans les endroits incultes (V. Bn.) 24. 5—6.
20. *Veronica officinalis* L., sur les coteaux arides aux environs de *Wilryck*, *Comptich*, *Schooten* et *Brasschaet*, (Dk.) et dans la Campine partout dans les lieux sablonneux le long des champs (nob.) 24. 5—7.
21. *Utricularia vulgaris* L., dans les eaux marécageuses entre *Berchem* et *Borgerhout* (Dk.) et à *Gheel* et *Tongerloo* (nob.) 24. 7—8.
22. *Utricularia minor* L., non *Thuil.*, dans les eaux marécageuses et stagnantes (Dk.) 24. 6—7.
23. *Lycopus europæus* L., *L. vulgaris*. Pers., les endroits humides et le long des fossés, assez commune (Dk.) 24. 6—9.
24. *Salvia pratensis* L., *Sclarea pratensis* Mill.; dans les prés (V. Bn.) 24. 5—7; je n'ai pas réussi jusqu'à présent à retrouver cette espèce qui cependant, au témoignage de plusieurs personnes, doit avoir été trouvée dans nos environs.

#### DIANDRIE DIGYNIE.

25. *Anthoxanthum odoratum* L., prés secs et bords des champs (Dk.) β. *Villosum* Dmtr., endroits ombragés près du *Vieux-Dieu* plus rare que l'espèce (nob.) 24. 5—6.

#### TRIANDRIE MONOGYNIE.

26. *Valeriana dioica* L. *V. montana*, Gesner non L., dans les endroits humides à *Deurne*, rare (Dk.) 24. 5—6.
27. *Valeriana officinalis* L., partout le long des fossés des prés (Dk.) 24. 6—7.
28. *Valerianella olitoria*, Moench, *Valeriana locusta* α. *olitoria* L., commune dans les lieux cultivés (V. Bn.) surtout dans l'intérieur et sur le glacis de la citadelle (nob.) ①. 4—5.
29. *Valerianella dentata*. Decand. *Valeriana locusta* ε. *dentata* L., dans les champs frais aux environs de *Wilryck* et *Contich* (V. Bn.) ①. 5—7.
30. *Iris pseudo-acorus* L. *J. paludosa* Pers., commune dans les marais et les ruisseaux fangeux (Dk.) 24. 5.
31. *Eriophorum latifolium*, Hoppe. ε. *polystachyum* L., dans les bruyères de la Campine (Dk.) entre *Wikkervorst* et *Hulshout* là surtout où l'eau a séjourné pendant l'hiver (nob.) 24. 4—5.
32. *Eriophorum angustifolium* Roth. *E. polystachyum* Polich. Cart. dans les prés marécageux, aux environs de *Gheel* et *Westerloo* (nob.). Cette espèce a été confondue avec l'*E. latifolium*

*Roth.* (*E. polystachyum* L.) par MM. *Dekin* et *Van Beneden*.  
24. 4—5.

33. *Eriophorum vaginatum* L., *E. Cæspitosum*, *Host.*, les endroits tourbeux dans la Campine (Dk.) 24. 4—5.
34. *Scirpus fluitans*, L., *Isolepis fluitans brevicaulis* *Decand.*, les bords des étangs et endroits marécageux aux environs de *Gheel* (Kx.) 24. 6—7.
35. *Scirpus cæspitosus* L., dans les endroits stériles et humides (V. Bn.) entre *Oolen* et *Tongerloo* rare (nob.) 24. 5—6.
36. *Scirpus bæothryen* L., nous avons trouvé cette espèce sur les bords des fossés de la lunette du *Kiel* (nob.). C'est probablement cette espèce que M. *Van Beneden* a indiquée sous la dénomination de *Sc. Cæspitosus* L. 24. 6.
37. *Scirpus acicularis*, L., dans les lieux inondés (V. Bn.) aux environs de *Boischot* dans la Campine (Kx.) ①. 6—7.
38. *Scirpus pulustris* L., les endroits marécageux dans le Poldre près d'*Austruweel* (Dk.).  $\beta$ . *reptans* *Dmtr.*, dans les mêmes localités mais plus rare (nob.) 24. 6—8.
39. *Scirpus setaceus* L., *Isolepis setacea* R. *Brown*. *Mariscus setaceus* *Moench*. Dans les lieux humides, les bords des marais, des bois (V. Bn.) sur les bords des fossés, le long du chemin de fer près de la campagne de M. *Van Vaerenbergh* sous *Berchem*. (*Westend.*) le  $\beta$ . *monostachys*, *Dmtr.*, dans les endroits humides des bruyères de la Campine (nob.) 24. 6—8.
40. *Scirpus triqueter* L., les endroits fangeux de l'Escaut (Kx.) 24. 7—8.
41. *Scirpus lacustris* L., les endroits marécageux et les bords des étangs aux environs de *Oorderen Swyndrecht* (Dk.) 24. 6—7.
42. *Scirpus glaucus* *Sm.*, les marécages entre *Merxem* et *Austruweel*, rare (nob.) 24. 6—7.
43. *Scirpus campestris*, *Roth.* *Sc. Bæothryen*  $\beta$ . *minor* *Schrad.*, les lieux incultes et humides aux environs de *Eyndhout* dans la Campine (Kx.) 24. 6—7.
44. *Scirpus sylvaticus* L., *Sc. gramineus*. *Neck.*, dans les prés aux environs de *Kiel*, près de la lunette *Herenthals* (Dk.) à *Westerloo* dans la Campine (nob.) 24. 6—7.
45. *Scirpus maritimus* L., croit partout le long de l'Escaut et les bords des fossés dans les Poldres (Dk.) Les variétés  $\beta$ . *monostachys* *Dmtr.*, entre la *Tête de Flandre* et *Swyndrecht* (nob.)  $\gamma$ . *compactus* *Dmtr.*, les bords de l'Escaut, (nob.) et le  $\delta$ . *macrostachys* dans les fossés de la lunette du *Kiel* (nob.) 24. 6—7. Dans la notice de M. *Van Beneden*, il y a double emploi relativement au *Scirpus maritimus* L., qui y figure d'abord sous ce nom, puis une seconde fois sous celui de *Sc. cyperoïdes*. *Lam*; peut-être même une troisième fois sous celui de *Sc. mucronatus*, car l'absence de toute indication par rapport à l'auteur de l'espèce nous fait douter, s'il s'agit du *Sc. mucronatus*, *Pall.* (*Sc. triqueter*

ou du *Sc. mucronatus* Pall., qui est de nouveau notre *Sc. maritimus* L.

46. *Cyperus flavescens* L., dans les prés marécageux (Dk.) ①. 6—8.
47. *Cyperus fuscus* L., dans les lieux tourbeux (Dk.) ①. 6—8.
48. *Cladium mariscus*, R. Br. *Schœnus mariscus*, L., dans les endroits marécageux (Dk.) près de *Westmeerbeek*, dans la Campine (nob.) ②. 6—8.
49. *Schœnus albus* L., les endroits humides dans la bruyère entre *Gheel* et *Tongerloo* (Kx.) ②. 6—7.
50. *Schœnus fuscus* L., dans les lieux humides dans les bruyères (V. Bn.) entre *Veerle* et *Everbode* (nob.) ②. 6—7.
51. *Nardus stricta* L., dans les endroits sablonneux et arides (Dk.) dans les bruyères de la Campine (Kx.), entre *Berchem* et *Wilryck* (nob.) ②. 6—7.

#### TRIANDRIE DIGYNIE:

52. *Setaria glauca*, Beauv. *Panicum glaucum* L., dans les champs sablonneux (V. Bn.) le long du chemin de fer près de *Mortsel* (nob.) ①. 7—8.
53. *Setaria verticillata*, Beauv. *Panicum verticillatum* L., Host gr. 2 t. 14, dans les jardins potagers (Dk.) et les champs aux environs de *Wilryck* (nob.) ①. 7—8.
54. *Setaria viridis* Beauv. *Panicum viride* L. Host gr. 2. t. 14, dans les endroits cultivés (V. Bn.) entre *Berchem* et *Wilryck* (nob.) ①. 7—8.
55. *Setaria italica*, Beauv. *Panicum italicum* L., dans les champs cultivés (V. Bn.) ①. 7—8.
56. *Optismenus crusgalli* Dmtr. *Panicum crusgalli* L., assez commune dans les jardins aux environs de *Berchem* (Dk.) et les moissons dans la Campine ①. 7—8.
57. *Cynodon dactylon* Rich. *Panicum dactylon* L., dans les champs sablonneux (V. Bn.) ②. 7—9.
58. *Digitaria sanguinalis* Scop. *Panicum sanguinale* L., commune dans les jardins aux environs de *Berchem* (Dk.) et à *Westerloo* dans la Campine (nob.) ①. 6—8.
59. *Digitaria glabra*, Beauv. *D. humifusa*, Rich., dans les endroits sablonneux et humides à *Schooten Merxem*, et le long des chemins entre *Lierre* et *Kessel*, rare (nob.) ①. 7—8. M. Van Beneden inscrit dans sa Flore de la province d'Anvers une *Digitaria ambigua*. Aucune espèce de ce nom n'étant connue, nous devons en regarder l'indication comme le résultat d'une erreur.
60. *Panicum miliaceum* L. *Milium Panicum* Mill., cultivé dans les jardins (V. Bn.) ①. 7—8.
61. *Panicum capillare* Retz. non L. *Milium capillare*, Moench., aux environs de *Berchem* où elle est très-rare (nob.) ①. 7—8.
62. *Milium effusum* L. *Miliarum effusum*, Moench., dans les bois



- couverts (Dk.) près de la campagne de *Cantecrode* sous *Mortsel*, les bois de *Averbode* et de *Tongerloo* (nob.) 24. 5—6.
65. *Phalaris Arundinacea* L. *Boldingera arundinacea* Dmtr., le long des fossés à *Kattendyk*, les prés, près de la lunette *Herenthals*, etc. (Dk.) 24. 6—7.
64. *Phalaris phleoides* L. *Phleum læve*, Bieb., dans les endroits sablonneux (V. Bn.) entre *Herselt* et *Aerschot* (nob.) 24. 5—6.
65. *Phalaris canariensis* L. *Phalaris ovata*, Moench., cultivé (V. Bn.) ①. 7—8.
66. *Alopecurus agrestis* L. *A. myosuroïdes*, Huds., assez abondante dans les moissons aux environs de *Berchem* et *Deurne* (Dk.) ①. 6—7.
67. *Alopecurus geniculatus* L., dans les endroits humides sur les bords des eaux aux environs de *Berchem* et le glacis de la lunette *St-Laurent* (Dk.) 24. 6—8.
68. *Alopecurus pratensis* L. *Lej.* et *Mich.*, agr. Belg. n° 19, les prés humides (Dk.) à *Berchem* et les environs de *Deurne* (nob.) 24. 5—9.
69. *Alopecurus paludosus*? (V. Bn.) est-ce l'*A. paludosus* Beauv? dans ce cas la plante indiquée par M. Van Beneden serait identique avec l'*A. fulvus* de *Smith*.
70. *Phleum pratense* L., croît partout dans les prés humides (Dk.),  $\beta$  *nodosum* L., dans les endroits humides de la lunette *St-Laurent* 24. 5—10.
71. *Agrostis alba*, Schrad. *A. sylvatica* L., dans les prés aux environs de *Berchem* (Dk.)  $\beta$  *colorata*, *Lej.* et *Mich.* agr. 159. *A. hybrida*, Dmtr., agr. Belg., dans les terrains secs et sablonneux près du *Vieux-Dieu* (nob.) 24. 7—8.
72. *Agrostis canina* L., dans les moissons et les bords des champs (V. Bn.)  $\beta$  *mutica*, *Lej.* et *Court.*, aux environs de *Berchem* et *Borgerhout* (nob.) 24. 7—8.
73. *Agrostis spicaventi* L., vient partout dans les moissons (Dk.) ①. 6—7.
74. *Agrostis stolonifera*, L., dans les prés (Dk.) 24. 7—8.
75. *Agrostis capillaris*, L., les endroits sablonneux de la Campine (Dk.) ①. 6—7.
76. *Agrostis vulgaris* Schrad. *A. pumila* L., dans les environs de *Herenthals* dans la Campine (Kx.) 24. 7—8.
77. *Dactylis glomerata* L., commun partout dans les prés et le long des chemins (Dk.) 24. 6—8.
78. *Aira aquatica* L., *Catabrosa aquatica*, Beauv., dans les prés humides et les fossés (Dk.) 24. 5—6.
79. *Aira caespitosa* L. *Deschampsia caespitosa*, Beauv., dans les bois ombragés dans la Campine (Kx.),  $\beta$  *parviflora*, *Lej.* et *Mich.*, ag. aux environs de *Wilryck* (nob.) 24. 6—7.
80. *Aira flexuosa* L. *A. setacea*, Huds., les endroits incultes et arides (Dk.), dans le bois de *Tongerloo* (nob.) 24. 6—7.
81. *Aira canescens* L. non *Host.* *Corynophorus canescens*, Beauv.

les terrains stériles et sablonneux de la Campine (Dk.) et les environs de *Brasschaet* 24. 6-8.

82. *Aira multiculmus*, Dmtr. *A. canescens*, Host., non L., les endroits incultes et sablonneux à *Bonheyde* près de *Malines* (V. Bn.) 24. 6-7.
83. *Aira caryophyllea* L. *Avena caryophyllea*, Web., dans les environs de *Herselt* dans la Campine (Kx.) le long du chemin de fer près de *Hove* (nob.) ①. 5-7.
84. *Aira discolor*, Thuill. *A. flexuosa* var., Decand., les endroits sablonneux et humides dans les bruyères de la Campine (nob.) 24. 8-9.
85. *Molinia caerulea*, Koetr. *Melica caerulea*, L. *Enodium caeruleum*, Gaud., très-commune dans les endroits sablonneux, les bruyères et les bois un peu humides de la Campine (Kx.) 24. 8-9.
86. *Melica uniflora*, Retz. *M. lobelii*, Vill., dans les bois couverts (V. Bn.) à *Everbode* près de l'abbaye (Westend.) 24. 5-6.
87. *Nelica nutans*, L., *M. montana*, Huds, dans les bois couverts de la Campine (Dk.) 24. 5-6.
88. *Briza minor* L. (V. Bn.?). La plante indiquée sous ce nom par M. Van Beneden, est probablement une variété de la suivante. Le vrai *Briza minor* L. n'a été trouvé jusqu'ici que dans une seule localité du pays, aux environs de Bruxelles (voyez Kickx, *Flora Bruxellensis*, page 89).
89. *Briza media* L. *B. tremula*, Lmk., sur le glacis de la citadelle du côté de la lunette du Kiel et au fort Carnot à *Stuyvenberg* (Dk.) *B. albida*, Lej., *Fl. Spa* Revue, Lej. et Mich., agr. Belg. 175, croît dans les mêmes localités (nob.) 24. 5-7.
90. *Briza lutescens*, Desv. *B. Clusii*, Faucault, dans les prés secs aux environs de *Schooten* (nob.) ①. 5-6.
91. *Triodia decumbens*, Beauv. *Poa decumbens*, Scop. *Festuca decumbens* L., dans les bois couverts (V. Bn.) à *Everbode* et près de *Westerloo* (nob.) 24. 5-6.
92. *Poa annua* L., partout dans les jardins entre les pierres des rues peu fréquentées (Dk.) ①. 5-11.
93. *Poa aquatica* L. *Glyceria spectabilis*, Mert. et Koch, dans les fossés des prés près de la lunette Herenthals (Dk.) et dans la Campine 24. 6-7.
94. *Poa compressa* L. *P. muralis*, Mirbel, dans les lieux secs et sablonneux et sur les vieux murs (Dk.) 24. 6-8.
95. *Poa nemoralis* L., dans les bois ombragés (V. Bn.) aux environs de *Tongerloo*. Le *P. n. vulgaris*, Gaud., et le *P. n. spongifera* Gaud. Mich. et Lej., agr. Belg., croissent dans les bois couverts aux environs de *Wilryck* (nob.) 24. 7-9.
96. *Poa pratensis* L., les prés, les bords des champs et le long des chemins à *Hove* (Dk.),  $\beta$  *angustifolia*, Poir., dans les lieux stériles entre *Oevel* et *Tongerloo*, et le  $\beta$ . *colorata* *Weihe* ap. Lej. et Court., comp. sur le glacis de la citadelle (nob.) 24. 5-7.

97. *Poa trivialis* L., dans les bois couverts (Dk.) aux environs de *Tongerloo* et de *Everbode* (nob.) 24. 6-8.
98. *Poa angustifolia* (V. Bn.), c'est simplement notre variété du *Poa pratensis*.
99. *Poa alpina*? Cette espèce indiquée par M. Van Beneden comme croissant dans la province d'Anvers, a besoin de confirmation avant de pouvoir être admise.
100. *Poa rigida* L. *Glyceria rigida*, Sm., dans les lieux secs et sablonneux (V B N) ①. 5-6.
101. *Glyceria distans* L. *Wahlenb.* *Poa distans* L. *Lej.* et *Mich.*, agr. Belg. Cette belle graminée croît sur les bords des champs dans les polders, à la tête de Flandre près du fort St-Hilaire et près du fort Philippe (nob.) 24. 5-8.
102. *Glyceria maritima*, *Mert.* et *Koch*; *Mich.* et *Lej.* agr. Belg. n° 101, les bords limoneux de l'Escaut, entre *Kattendyk* et le fort *Philippe*, rare (nob.) 24. 5-8.
103. *Glyceria fluitans*, R. Br. *Festuca fluitans* L. *Poa fluitans* Scop., croît partout dans les eaux claires et stagnantes (Dk.) 24. 6-9.
104. *Festuca ovina* L. *Bromus ovinus* Scop., dans les endroits sablonneux (Dk.). *B. milica* Dmtr., entre *Oevel* et *Tongerloo* (nob.) 24. 5-6.
105. *Festuca capillata*, Lmk. Fl. fr., commun dans les endroits sablonneux aux environs de *Beverloo* (Wentend.) 24. 5-6.
106. *Festuca durinacula* L., se trouve dans les mêmes localités (Dk.) 24. 5-7.
107. *Festuca rubra* L. *Lej.* et *Mich.*, agr. Belg. n° 114, dans les bois humides, le long des chemins (Dk.), aux environs de *Wilryck* et *Contich* (nob.) 24. 6-8.
108. *Vulpia myuris*, Gmel. *Festuca myuris* L., dans les terrains sablonneux (V. Bn) entre *Oevel* et *Herenthals* (nob.) ①. 5-6.
109. *Vulpia bromoides*, Dmtr. γ. *Scimoïdes* Gmel. *Festuca bromoides* L., se trouve dans les mêmes localités (V. Bn.) ①. 5-6.
110. *Schœnodoros arundinaceus* Dmtr. agr. Belg. *Festuca elatior* L. *F. arundinacea* Schreb, le long des fossés des prés entre *Berchem* et *Borgerhout* et le long de l'Escaut (Dk.) 24. 6-7.
111. *Schœnodoros pratensis* R. S. *Lej.* et *Mich.*, agr. Belg. n° 112, dans les endroits humides aux environs de *Berchem* (nob.) 24. 6-7.
112. *Bromus squarrosus* L., les moissons dans les champs sablonneux (Dk.), ①. 6.
113. *Bromus mollis* L., partout dans les bois secs (Dk.) & *leptostachys* *Lej.* et *Court.* Comp. fl. Belg., sur le glacis près de la lunette *Herenthals* et les bords du chemin de fer près de *Mortsel* (nob.) ①. 5-6.
114. *Bromus racemosus* L. *B. pratensis*, Ehrh., dans les champs, hors la porte de Bruxelles à *Malines* (Westend.) ①. 5-6.
115. *Bromus elongatus* Gaud., dans les champs à *Wilryck*, *Contich*,

- et sur la digue de l'Escant près de *Austruweel* (nob.) ①. 7—8.
116. *Bromus secalinus* L. *Lej.* et *Mich.*, agr. Belg. n° 44, dans les moissons sous *Berchem* et *Deurne* (Dk.) ①. 6—7.
117. *Bromus grossus* Desf. *B. velatinus* *Schaad.*, les moissons environns de *Herenthals* (Kx.) et dans les polders près d'*Austruweel* (nob.) ①. 7—8.
118. *Bromus arvensis* L. *B. multiflorus* *Weig.*, dans les moissons (Dk.) ①. 7—8.
119. *Bromus inermis* L. le long du chemin de fer, dans les environs de *Berchem* et de *Mortsel* (nob.) ②. 6—7.
120. *Bromus erectus* *Huds.* croit sur les collines sablonneuses (V. Bn.) aux environs de *Beverloo* (Westend.) ②. 6—7.
121. *Bromus giganteus* L. *Festuca gigantea* *Vill.* *Schœnodoros giganteus* *Dmtr.* agr. Belg. dans les bois couverts et humides aux environs de *Berchem*, *Wilryk* et aux alentours de *Everbode* (nob.) ②. 6—8.
122. *Bromus asper* L. *Scœnodoros asper* *Gaud.*, dans les bois et les haies (V. Bn.) ②. 6—7.
123. *Bromus pinatus* L. *Festuca pinata* *Schrad.*, sur les colines sablonneuses dans la Campine (Dk.) ②. 6—7.
124. *Bromus sterilis* L. commun sur les bords des chemins près des habitations (Dk.) ①. 6—9.
125. *Bromus tectorum* L., sur le glacis de la citadelle du côté de la lunette St-Laurent (D K) ①. 5—6.
126. *Brachypodium sylvaticum* *Beauv.* *Bromus sylvaticus* *Smith.*, dans les bois couverts aux alentours de l'abbaye de *Everbode*, très-rare (nob.) ②. 7—8.
127. *Brachypodium distachyon* *Beauv.* *Bromus distachyos* L. les bords des chemins dans les champs (Westend.) ①. 5—6.
128. *Avena sativa* L., cultivé (Dk.) ①. 7—8. *Avena strigosa* *Schreb.* *Danthonia strigosa* *Beauv.*, se rencontre souvent avec l'*A. sativa* ①. 7—8.
129. *Avena fatua* L. non *Schreb.*, dans les champs cultivés aux environs de *Berchem* (Dk.) ①. 7—8.
130. *Avena sterilis* L. *Avena fatua* *Schreb. non* L., dans les champs cultivés, rare (D K) ①. 7—8.
131. *Trisetum pratense* *Dmtr.* *Avena pratensis* L., dans les prés secs assez rare (V. Bn.) ②. 6—8.
132. *Trisetum flavescens* *Beauv.* *Avena flavescens* L., dans les prés secs, sous *Berchem* (nob.) ②. 7—9.
133. *Trisetum pubescens* *Pers.* *Avena pubescens* L., dans les prés secs, et sur le glacis de la ville (nob.) ②. 5—7.
134. *Trisetum præcox* *Dmtr.* *Aira præcox* L., dans les terrains sablonneux (V. Bn.) les bords des chemins aux environs de *Westerloo* et de *Tongerloo* (nob.) ①. 4—6.
135. *Calamagrostis Epigeios* *Roth.*, dans les bois élevés aux alentours de *Everbode* (V. Bn.) ②. 7—8.
136. *Calamagrostis lanceolata* *Roth.* *Arundo calamagrostis* L.,



- les endroits humides dans le bois de *Everbode* (Dk.), les bords des fossés à *Beverloo* (Westend.) et aux environs de *Tongerloo* (nob.) 2. 6—7.
157. *Calamagrostis Halleriana* Decand. *Arundo Halleriana* Gaud., sur les bords des fossés de la campagne de *Cantecrode* sous *Mortsel*; très-rare (nob.) 2. 7.
158. *Arundo phragmites* L. *A vulgaris* Lam. ill., sur les bords de l'Escaut et partout dans les polders. (Dk.) L. A. *nigricans* cité par M. Van Beneden comme espèce, n'est qu'une variété de la dernière 2. 7—8.
159. *Anmophila arenaria* Dmtr. *Arundo arenaria* L. *Lej.* et *Mich.* agr. belg. (n° 24), collines sablonneuses du côté de *Hechtel* (Westend.) entre *Gheel* et *Lichtaert* (nob.) très-rare, 2. 7—8. C'est à cette espèce qu'appartient, selon M. Kickx, le *Phalaris stricta* Dek.
- 140 *Secale cereale* L., cultivé partout (Dk.) 2. 5.
141. *Triticum hybernum* L., cultivé (V. Bn.) 2. 6.
142. *Triticum aestivum* L., cultivé (V. Bn.) 1. 6.
145. *Triticum spelta* L., cultivé dans les environs de *Beverloo* (V Bn.) 1. 6—7.
144. *Agropyron junceum* Beauv. *Triticum junceum* L., les bords de l'Escaut à la Tête de Flandre (Dk.) 2. 6—7.
145. *Agropyron glaucum* R. et S., les bords de l'Escaut et sur le glacis de la citadelle, près de la lunette St-Laurent (V. Bn.) 2. 6—8.
146. *Agropyron pungens* R. et S., les bords de l'Escaut  $\alpha$  *acutum* Dmtr., sur le glacis de la citadelle.  $\delta$  *Setigerum* Dmtr., les bords de l'Escaut. *E. barbatum* Dmtr., pêle-mêle avec la dernière (nob.) 2. 6—8.
147. *Agropyron repens* Beauv. *Triticum repens* L., commune partout dans les champs cultivés (Dk.)  $\beta$  *barbatum* Dmtr., dans les mêmes localités (nob.) 2. 6—7.
148. *Agropyron Caninum* Beauv. *Elymus caninus* L., *Lej.* et *Mich.* agr. belg. n° 198, dans les taillis et les bois couverts, entre *Duffel* et *Malines* (V. Bn.) 2. 6—8.
- 149 *Agropyron sylvaticum*..... (V. Bn. ?). L'absence de synonymie nous empêche de dire avec certitude si c'est le *Triticum sylvaticum* de Moench ou celui de *Salisb.*
150. *Agropyron intermedium* Rchb., les bords des champs humides à *Tongerloo* très-rare (nob.) 2. 6—7.
151. *Hordeum hexastichum* L., cultivé (V. Bn.) 1. 6—7.
152. *Hordeum distichum* L., cultivé (V. Bn.) 1. 6—7.
153. *Hordeum vulgare* L., cultivé (Dk.) 1. 6—7.
154. *Hordeum nodosum* L., *Lej.* et *Mich.* agr. belg. n° 90, les prés et les endroits incultes sous *Berchem* (nob.) 2. 6—7.
155. *Hordeum pratense* Roth. *H. nodosum*  $\alpha$  *pratense* Dmtr., dans les prés entre *Berchem* et *Borgerhout* assez rare (nob.) 2. 6—7.
156. *Hordeum secalinum* Schreb. *H. nodosum*  $\beta$  *secalinum* Dmtr., les lieux humides aux environs de *Berchem* (Dk.) 2. 6—7.

137. *Hordeum murinum* L. *Lej.* et *Mich.* agr. belg. n° 89, dans les lieux frais près des habitations (Dk.) ①. 6—8.
138. *Hordeum maritimum* With. *H. hystrix* Roth., assez commune sur les digues de l'Escaut et bords des chemins dans les poldres (nob.) ①. 6—7.
139. *Hordeum Zeocriton* L. *Zeocriton commune* Beauv., cultivé (Dk.) ①. 7.
160. *Elymus arenarius* L., les endroits sablonneux près de Lillo (Dk.) ②. 6—7.
161. *Lolium perenne* L., partout dans les prés secs et les bords des chemins (Dk.),  $\beta$  *tenue* Dmtr. L. *tenue* Linn., les lieux humides entre *Contich* et *Edeghem*,  $\gamma$  *Cristatum* Dmtr., les endroits secs et dans l'intérieur de la citadelle,  $\delta$  *ramosum* Dmtr., les bords du chemin de fer près de *Mortsel*, *E. viviparum* Dmtr., dans la même localité, mais plus rare (nob.) ②. 6—8.
162. *Lolium lucidum* Dmtr. agr. belg., les champs cultivés aux environs de *Hove* et *Contich* (nob.) ①. 6—7.
163. *Lolium temulentum* L., dans les moissons aux environs de *Berchem* où elle est très-rare (Dk.) ①. 6—7.
164. *Lolium multiflorum*? si c'est de l'espèce de *Lam.* comme tout doit le faire supposer, dont M. Van Beneden a entendu parler, nous hésitons à la croire indigène à la province.
165. *Lepiuris incurvata* Dumtr., agr. Belg. tab. 16. f. 5, *Rottbolia incurvata* L., dans le sable mouvant près de la coupure entre la *Tête de Flandre* et *Burcht*, rare (nob.) ①. 6—8.
166. *Cynosurus cristatus* L. *Phleum cristatum* Scop., commune partout dans les prés secs (Dk.) ②. 6—7.

#### TRIANDRIE TRIGYNIE.

167. *Montia fontana* L. *Cameraria fontana* Moench., dans les champs humides de *Berchem*, *Deurne*, *Wilryck*, (Dk.) et à *Westerloo*, dans la Campine (nob.), ①. 5—8.
168. *Holosteum umbellatum* L. *Cerastium umbellatum* Huds., le bords des champs à *Stuyvenberg* (Dk.) ①. 5—5.

#### TÉTRANDRIE MONOGYNIE.

169. *Dipsacus fullorum* L. *D. sativus* Mill., cultivé par les fabricants de drap à *Moll* et *Réthy* dans la Campine (Dk.) ②. 7—8.
170. *Dipsacus sylvestris* L., dans les lieux incultes (V. Bn.) à la *Tête de Flandre*, les bords des chemins entre *Austruweel* et *Eeckeren* (nob.) ②. 7—8.
171. *Dipsacus pilosus* L. (V. Bn.). Nous n'avons pas réussi à retrouver cette espèce, propre cependant à plus d'une localité de notre pays.
172. *Scabiosa arvensis* L., les bords des champs aux environs de *Wilryck* (Dk.) ②. 6—7.

173. *Scabiosa columbaria* L. *Astrocephalus columbaria* Wallr. (Dk.), ne croit plus aujourd'hui dans la province d'Anvers, selon M. Kickx.
174. *Scabiosa succisa* L. *Succisa pratensis* Moench., dans les bois et les prés peu humides de la Campine (Dk.) 24. 7—9.
175. *Centunculus minimus* L., les endroits humides dans les bruyères (Dk.) ①. 6—7. Petite plante qui a constamment échappé à nos recherches.
176. *Plantago graminea* Lmk. *P. maritima* Dek., sur les bords de l'Escaut entre Cattendyk et le fort Philippe (nob.) 24. 6—8.
- Les feuilles de cette espèce varient beaucoup en largeur, de manière cependant à rester toujours entre 6 et 12 millimètres, elles sont du reste linéaires, trinervées, plus ou moins planes, cartilagineuses sur leurs bords, marquées vers le sommet de dents très-écartées, souvent à peine sensibles. Bractées ovales-lancéolées, subulées, concaves, delà la largeur des sépales qui sont ovés. Dans le vrai *Plantago maritima* Linn. que l'on confond souvent avec l'espèce dont il est ici question, les feuilles sont au contraire uninerves, convexes en dessous, très-entières, linéaires, de 2 à 3 millimètres de largeur. Les bractées y sont ovales, obtuses, concaves, plus courtes que les sépales qui sont oblongs. La stature de ce plantain maritime est d'ailleurs plus petite et moins stricte.
- Il est bon de remarquer en outre que les figures du *Pl. angustifolia* Dod. pempt. 108. et du *Pl. marina* Lob. icon. 506, citées par Lamarek (encycl. méthod., tome V), la première a son *Plantago graminea*, l'autre au *Plantago maritima* sont identiques et ne représentent exactement aucune des deux espèces quoiqu'elles se rapprochent le plus par le port du plantain maritime.
177. *Plantago coronopus* L. *P. coronopifolia* Murr., sur les bords des chemins dans les endroits sablonneux, commune partout à Brasschaet et dans la Campine (Dk.) 24. 6—8.
178. *Plantago lanceolata* L., croit dans les champs, les prés secs et les bords des chemins (Dk.), γ *Bomosa* Dmtr., dans les endroits humides. ζ *polystachya* Coening, le long des chemins aux environs de Deurne (nob.) 24. 4—9.
179. *Plantago media* Dod., sur le glacis de la citadelle où elle est très-rare (Dk.) 24. 6—9.
180. *Plantago major* Dod., croit partout le long des chemins dans les lieux cultivés (Dk.). B. *Bracteata* Lmk., sur les bords des chemins, près de la station du chemin de fer, et dans l'intérieur de l'hôpital St-Élisabeth d'Anvers (nob.) 24. 6—9.
181. *Exacum filiforme* L., dans les endroits humides des bruyères de la Campine (Kx.) ①. 7—8.
182. *Rubia tinctorum* L., cultivé dans les poldres aux environs d'Austruweel et de Oorderen (nob.) 24. 5—7.
183. *Galium cruciata* Scop. *Valantia cruciata* L., les bords des

- champs humides entre *Kiel* et *Hoboken*, assez rare (Dk.) 24. 5—7.
184. *Galium aparine* L. *Aparine hispida* Moench., commune partout dans les haies et les taillis (Dk.) ①. 6—9.
185. *Galium uliginosum* L. G. *Spurium* Spreng., les endroits humides et les bords des étangs marécageux aux environs de *Tongerloo* (Dk.) 24. 5—7.
186. *Galium palustre* L., dans les fossés et les eaux stagnantes aux environs de *Deurne* et de *Borgerhout* (Dk.) 24. 5—7.
187. *Galium album* Lam., fl. fr. G. *mollugo* L., dans les bois, taillis et les bords des champs ombragés (Dk.) 24. 5—8.
188. *Galium sylvaticum* L., dans les endroits ombragés entre *Kiel* et *Wilryck* (nob.) 24. 6—8.
189. *Galium verum* L. G. *luteum* Lamk., fl. fr., sur le glacis de la citadelle (Dk.), les vieux remparts de *Herenthals* dans la Campine (nob.) 24. 6—8.
190. *Asperula odorata* L. *Galium odoratum* Scop., croît dans l'intérieur et aux alentours de l'abbaye de *Everbode* (Kx.) 24. 5—8.
191. *Asperula tinctoria* L. *Galium triendrum* Scop., cette belle plante a été observée aux environs de *Schriek* par M. Donckelaer, jardinier en chef du Jardin botanique de Gand, au mois de juillet 1852 24. 6—7.
192. *Sherardia arvensis* L., dans les champs des polders près de *Austruweel*, et aux environs de *Wilryck* et *Contich* (Dk.) ①. 6—9.
195. *Cornus mas* L. C. *nudiflora* Dmtr., cultivé (V Bn.) ②. 5—4.
194. *Cornus sanguinea* L., dans les bois taillis aux environs de *Contich*, *Wilryck* et *Berchem* (Dk.) ②. 6—7.
195. *Alchemilla aphanes* Leers. *Aphanes arvensis* L., partout dans les champs cultivés (Dk.) ①. 6—9.
196. *Alchemilla vulgaris* L., dans les prés secs surtout quand ils sont ombragés (V Bn.) à *Rethy*, et les bois humides de *Tongerloo* (nob.) 24. 4—7.
197. *Isnardia palustris* L. *Ludwigia repens* Sw., dans les mares aux environs de *Wechter* et *Tremeloo* (Kx.) entre *Gheel* et *Tongerloo* (nob.) 24. 7—9.

#### TETRANDRIE DIGYNIE.

198. *Cuscuta epulinum* Weihe. Parasite sur le lin dans la Campine (nob.) ①. 7.
199. *Cuscuta europea* L. Parasite sur l'ortie et le chanvre, dans la Campine (Dk.) ①. 7—9.
200. *Cuscuta epithymum* Murr. Parasite sur l'*Erica vulgaris* L., entre *Gheel* et *Herenthals* (Kx.) ①. 7—8.



TETRANDRIE TETRAGYNIE.

201. *Ilex aquifolium* L., dans les bois couverts de *Tongerloo* et de *Everbode* (Dk.) ①. 5—6.
202. *Potamogeton natans* L., les eaux stagnantes de la Campine (Dk.) ②. 6—8.
203. *Potamogeton fluitans* Roth. non Smith., dans les ruisseaux et la Nèthe aux environs de *Westerloo* (nob.) ②. 6—7.
204. *Potamogeton lucens* L., dans les eaux marécageuses, entre *Merxem* et *Austruveel* (Dk.) ②. 7—8.
205. *Potamogeton heterophyllus* Schreb., dans les eaux stagnantes (V. Bn.); nous n'avons pas encore rencontré cette espèce.
206. *Potamogeton perfoliatus* L., croît dans les eaux stagnantes (Dk.) entre *Anvers* et *Lierre* (Kx.) et les fossés de la ville d'*Anvers*, hors la Porte rouge (nob.) ②. 6—8.
207. *Potamogeton crispus* L., dans les eaux stagnantes (V. Bn.) dans le polder de *Burcht*. (nob.) ②. 6—8.
208. *Potamogeton densus* L., dans les fossés, près d'*Austruveel* (Dk.) aux environs de *Malines* (Westend.) ①. 6—7.
209. *Potamogeton oppositifolius* Decand., *P. Serratum* L., dans les fossés de la ville hors la Porte rouge (V. Bn.) ②. 7—8.
210. *Potamogeton compressus* L., dans les fossés aux environs de *Herselt* dans la Campine (Kx.) entre *Berchem* et *Borgerhout*, rare (nob.) ②. 7—8.
211. *Potamogeton pectinatus* L., dans les eaux stagnantes (Dk.) et les fossés de l'ancien château de *Westerloo* (Kx.) ②. 7—8.
212. *Potamogeton pusillus* L. *P. Gramineum* V. Ben.? dans le canal de *Herenthals* sous *Deurne* et les ruisseaux aux environs de *Westerloo* (nob.) ②. 6—8.
213. *Radiola millegrana* Smith. *Linum radiola* L., croît dans les endroits humides des bruyères de la Campine et de *Brasschaet* (Dk.) ①. 7—8.
214. *Sagina apetala* L. *S. erecta*,  $\beta$ . Lam., dans les moissons entre *Berchem* et *Vieux-Dieu* (nob.) ①. 5—7.
215. *Sagina procumbens* L., sur les bords des fossés nouvellement creusés et les champs humides aux environs de *Berchem* (Dk.) ②. 5—10.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

216. *Myosotis arvensis* With M. *annua* Lap. M. *stricta* Lk., dans les champs aux environs de *Borgerhout* et de *Deurne* (DK.) ①. 5—8.
217. *Myosotis versicolor* Sm., dans les champs humides aux environs de *Linth*. et *Duffel* (V. Ben.) ①. 5—7.

218. *Myosotus intermedia* Lk., dans les champs aux environs de *Hove* et *Wiltryck* (nob.) ②. 5—8.
219. *Myosotus strigulosa* Richb., dans les prés, entre *Berchem* et *Borgerhout*, très-rare (nob.) ②. 5—7.
220. *Myosotus palustris* With., sur les bords des fossés et des ruisseaux. *β. repens* Dmtr., dans les eaux stagnantes et marécageuses aux environs de *Berchem* (nob.) ④. 6—10.
221. *Lithospermum officinale* L., cultivé (V. Bn.) ④. 5—7.
222. *Lithospermum arvense* L., dans les moissons aux environs de *Deurne*, *Wiltryck*, *Contich* (V. Bn.) et dans la Campine (nob.) ①. 5—7.
223. *Cynoglossum officinale* L., croît dans les environs de *Ruysbroeck* (Dk.) ②. 5—6.
224. *Anchusa italica* Willd. (V. Bn.?), espèce plus que problématique dans notre flore.
225. *Pulmonaria officinalis* L. (V. Bn.?) Cette plante n'a pas encore été trouvée dans notre province, à ce que nous sachions, elle n'est cependant pas rare dans les autres provinces de la Belgique.
226. *Symphytum officinale* L., croît partout dans les prés et les bords des fossés (Dk.) ④. 5—7.
227. *Lycopsis arvensis* L. *Anchusa arvensis* R. Brst., dans les champs de *Contich*, *Wiltryck* et dans la Campine (Dk.) ①. 4—6.
228. *Echium vulgare* L. *E. anglicum* Mill., sur le glacis de la citadelle et l'esplanade, près de l'Escaut (Dk.) ②. 6—8.
229. *Primula elatior* Jacq. *P. veris. β. elatior* L., sur les bords des fossés dans les lieux couverts et humides aux environs de *Deurne*, *Wiltryck*, etc., (Dk.) ④. 5—4.
230. *Primula acaulis* Jacq. *P. grandiflora* Lam., cultivé (V. Bn.) ④. 5—4.
231. *Anagallis tenella* L. *Lysimachia tenella* Mill., croît dans les endroits marécageux (Dk.) aux environs de *Herselt* et *Vorstheyde* (Kx.) rare ④. 6—8.
232. *Anagallis arvensis* L. *A. phoenicea* Lam., assez commune dans les champs (Dk.); ①. 6—9.
233. *Anagallis caerulea* Schreb. *A. arvensis β. L.* (V. Bn.), petite plante assez rare dans la Belgique entière.
234. *Lysimachia nummularia* L., commune partout sur les bords des fossés dans les endroits humides (Dk.) ④. 6—7.
235. *Lysimachia nemorum* L. *Lerouptia nemorum* Merat. (Dk.) rare ④. 5—8.
236. *Lysimachia vulgaris* L., dans les endroits humides et ombragés (Dk.) ④. 6—9.
237. *Lysimachia thyrsiflora* L., dans les endroits humides (V. Bn.). Cette espèce, assez commune dans le Brabant septentrional, doit probablement croître aussi dans notre province. Néanmoins, nous ne l'avons jamais rencontrée.

238. *Hottonia palustris* L., dans les eaux claires et stagnantes, assez commune partout (Dk.) 24. 5—7.
239. *Menyanthes trifoliata* L., dans les lieux marécageux entre *Kiel* et *Hoboken* (Dk.) et à *Westerloo* dans la Campine (nob.) 24. 5—6.
240. *Linnanthemum nymphoides* Gmel, *Menyanthes nymphoides* Thunb. non L., dans les fossés et les étangs (Dk.) aux environs de *Boom* (Kx.) et entre la *Tête de Flandre* et *Swyndrecht* (nob.) 24. 6—8.
241. *Convolvulus arvensis* L., commune dans les champs sablonneux et sur les fortifications de la ville (Dk.) 24. 5—7.
242. *Convolvulus sepium* L. *Calystegia sepium* R. Br., commune dans les haies et les bois taillis (Dk.) 24. 7—9.
243. *Convolvulus soldanella* L., *Calystegia soldanella* R. B. croissait en 1820 ou 1821, dans les endroits dénudés et sablonneux, le long de l'Escaut près d'*Austruweel* (Dk.) 24. 6—7.
244. *Datura stramonium* L., croît dans l'intérieur et aux alentours de l'abbaye de *Everbode* (Dk.) ①. 7—9.
245. *Hyoscyamus niger* L., dans les endroits incultes près des habitations (Dk.), assez rare aujourd'hui, ②. 5—8.
246. *Verbascum blattaria* L., dans les champs cultivés (V. Bn.) entre *Everbode* et *Moolstede* (nob.) ②. 6—8.
247. *Verbascum nigrum* L., le long des chemins près des habitations (Dk.) sur les ruines et aux alentours de l'abbaye de *Tongerloo* (nob.).
248. *Verbascum lychnites* L., aux alentours de l'abbaye de *Everbode*, rare (Kx.) ②. 6—8.
249. *Verbascum Tapsus* L., dans les lieux secs et sablonneux à *Deurne*, (Dk.) *Herenthals*, *Gheel*, et aux alentours de l'abbaye de *Tongerloo* (nob.) ②. 6—8.
250. *Vinca minor* L., dans les bois couverts entre *Merxem* et *Schooten* (Dk.) et les environs de *Tongerloo* (nob.) 24. 4—5.
251. *Solanum tuberosum* L., cultivé partout (V. Bn.) 24. 7—8.
252. *Solanum nigrum* L. *S. vulgatum* Willd., croît partout dans les jardins potagers et les endroits incultes près des habitations (Dk.) ①. 6—10.
253. *Solanum ochroleucum*, *Bastard*., Journ. bot. 5, p. 20 (V. Bn.), n'a pu être indiqué dans la Flore d'Anvers que par méprise.
254. *Solanum dulcamara* L., les bords des fossés et des eaux stagnantes (Dk.) 24. 5—7.
255. *Samolus valerandi* L., *S. aquaticus* Lam., fl. fr., sur les bords des fossés dans le Poldre, près du fort du *Nord* et à la *Tête de Flandre* (nob.) ②. 6—8.
256. *Viola canina* Richb., croît dans les terrains sablonneux et ombragés, commune partout (Dk.) 24. 4—5.
257. *Viola palustris* L., dans les endroits marécageux (Dk.) près de *Schriek* (Kx.) entre *Oevel* et *Lichtaert*, pêle-mêle avec l'*An-*

- dromeda polifolia*, et les prés spongieux entre *Westerloo* et *Tongerloo* (nob.) 2l. 4—6.
258. *Viola odorata* L., dans les lieux frais à *Wilryck*, sur le glacis de la ville et dans la Campine (Dk.) 2l. 5—4.
259. *Viola tricolor* L., commune dans les champs sablonneux aux environs de *Wilryck*, et partout dans la Campine (Dk.) ①. 4—10.
260. *Viola arvensis* Murr., dans les champs frais, assez commune (V. Bn.) ①. 4—8.
261. *Phyteuma spicatum* L., croît dans les bois couverts aux environs de *Brasschaet* (Dk.) 2l. 5—7.
262. *Phyteuma nigrum* Schm., dans les bois couverts de *Everbode* (Kx.) et aux environs du *Donck* près de *Brasschaet* (nob.) 2l. 5—7.
265. *Jasione montana* L., dans les terrains sablonneux aux environs de *Wilryck*, *Mervem*, et partout dans la Campine (Dk.) ②. 6—9.
264. *Campanula hederacea* L. *Roucela hederacea* Dmtr., les endroits sablonneux et humides aux environs de *Westerloo* (Kx.) 2l. 5—8.
263. *Campanula rapunculus* L., le long des chemins et les bois taillis aux environs de *Eeckeren* (Dk.) ②. 5—8.
266. *Campanula persicifolia* L., dans les environs de *Eeckeren* (Dk.) et de *Beverloo* (Westend) 2l. 6—7.
267. *Campanularapunculoïdes* L. *C. nutans* Lam., fl. fr., croît dans les haies et les endroits ombragés (Dk.) 2l. 6—8.
268. *Campanula rotundifolia* L. *C. diversifolia* Dmtr., dans les lieux sablonneux à *Wilryck* et dans la Campine (Dk.) 2l. 5—9.
269. *Campanula trachelium* L., croît pêle-mêle avec le *Phyteuma nigrum*, dans les endroits couverts et humides près de *Brasschaet* (Dk.) 2l. 6—8.
270. *Prismatocarpus speculum*, l'Her. *campanula speculum* L., dans les champs cultivés de *Lierre* et de *Hore* (Dk.) ①. 6—8.
271. *Prismatocarpus hybridus*, l'Her. *campanula hybrida* L., croît dans les champs (Dk.), très-rare ①. 7—8.
272. *Lobelia dortmanna* L., croît dans les étangs des bruyères de la Campine entre *Eyndhout* et *Everbode* (Kx.). M. Sommé l'a observé dans les environs de *Wortel* et de *Hoogstraeten* ②. 6—8.
275. *Impatiens nolitangere* L. (Dk.), plante qui devient de plus en plus rare dans toute la partie septentrionale de la Belgique, et que nous n'avons plus retrouvée.
274. *Lonicera peryclymeum* L., croît dans les bois taillis aux environs de *Schooten*, *Brasschaet* et dans la Campine (Dk.). Cette espèce est souvent confondue avec le *L. caprifolium* L., ②. 6—8.
275. *Rhamnus catharticus* L., croît dans les bois taillis aux environs de *Zammel* dans la Campine, assez rare (Dk.) ②. 4—6.
276. *Rhamnus frangula* L. *Frangula alnus*, croît partout dans les bois taillis (Dk.) ②. 5—8.
277. *Eronymus europæus* L. *E. vulgaris* Lam., fl. fr., dans les bois



- aux environs de *Wilryck*, *Contich* et *Waelhem* (Dk.) ②. 5—6.
278. *Ribes uracrispa* L. *R. spinosum* Lam., fl. fr., dans les haies (Dk.) ②. 4—5.
279. *Ribes nigrum* L., cultivé dans les jardins (V. Bn.) à l'état spontané, sur les bords des fossés, dans les prés entre *Deurne* et *Borsbeek*, et entre *Zammel* et *Tongerloo* (nob.) ②. 5—6.
280. *Ribes rubrum* L., cultivé (V. Bn.) ②. 4—5.
281. *Hedera helix* L. commun partout dans les bois de *Brasschaet* et dans ceux de la Campine (Dk.) ②. 9—10.
282. *Erythrœa centaurium* Rich. *Chironia centaurium* Smith. *Gentiana centaurium* L., croît dans les terrains sablonneux et humides aux environs de *Wilryck* (Dk.), *Oolen* et *Tongerloo* dans la Campine (nob.) ①. 6—8.
285. *Erythrœa ramosissima* Pers. *Gentiana centaurium* β. L., sur les bords des marais et les endroits où l'eau a séjourné pendant l'hiver, à la *Tête de Flandre*, très-rare (nob.) ①. 6—8.
284. *Erythraea pulchella* Fries. *Chironia pulchella* Smith., les endroits incultes et humides (V. Bn.) ①. 6—9.
285. *Illecebrum verticillatum* L. *Paronychia verticillata* Lam., fl. fr., croît partout dans les bruyères et les endroits sablonneux (Dk.) ②. 6—8.
286. *Glauv. maritima* L., sur les bords de l'Escaut inondés par les hautes marées (nob.) ②. 5—6.

# PENTANDRIE DIGYNIE.

287. *Gentiana pneumonanthe* L. *G. linearifolia* Lam., fl. fr., croît dans les endroits humides des bruyères de *Brasschaet* et dans la Campine (Dk.) ②. 8—9.
288. *Chenopodium fetidum* Lam. *C. vulvaria* L., dans les lieux incultes près des habitations (Dk.), croissait il y a quelques années sur l'esplanade selon M. Rigouts, où il a entièrement disparu aujourd'hui ①. 6—8.
289. *Chenopodium glaucum* L. M. Dekin l'a trouvé sur un tas de décombres hors la porte des Béguines. Cette plante n'existe plus qu'à Bruxelles où M. Kickx l'avait également rencontrée une seule fois.
290. *Chenopodium album* L. et sa variété *Chenopodium viride*, croissent sur les bords des champs à *Boom*, *Bonheyde*, etc. (Dk.) ①. 7—9.
291. *Chenopodium polyspermum* L., croît dans les champs humides aux environs de *Berchem* (Dk.) β. *Cymosum* Chev., sur les bords du chemin de fer dans la même localité (Westend.) ①. 7—8.
292. *Chenopodium urbicum* L. *C. deltoideum* Lam., fl. fr., aux alentours de l'abbaye de *Everbode*, rare (nob.) ①. 6—8.

295. *Chenopodium hybridum* L., dans les lieux cultivés (Dk.) ①. 6—8.
294. *Chenopodium rubrum* L., dans les champs argileux et à la *Tête de Flandre* (Dk.) ①. 7—8.
295. *Chenopodium blitoides* Lej., fl. Sp., n° 126, croît aux alentours et dans l'intérieur du fort *Swyndrecht* près de la *Tête de Flandre* et sur l'esplanade près de l'Escaut (nob.) ①. 7—8.
296. *Chenopodium murale* L., dans les endroits incultes près des habitations à *Borgerhout* et *Westerloo* (Dk.) ①. 6—9.
297. *Chenopodium concatenatum* Thuil., dans les endroits sablonneux (V. Bn. ?) ①. 7—9.
298. *Chenopodium bonus henricus* L. *C. sagittatum* Lam., fl. fr., les endroits incultes (Dk.) ②. 5—9.
299. *Kochia hirsuta* Dmtr., fl. belg. *Sasola hirsuta* L., dans les lieux dénudés, le long de l'Escaut entre le glacis du fort *Philippe* et *Lillo*, rare (nob.) ①. 8—9.
500. *Herniaria glabra* L., dans les champs aux environs de *Duffel* et *Waerloos* (Dk.) ②. 7—8.
501. *Herniaria hirsuta* L., croît dans les moissons aux environs de *Duffel* (Dk.) ②. 7—8.
502. *Ulmus campestris* L., assez commune dans les bois (Dk.) ②. 5.
503. *Ulmus suberosa* Willd. non Ehrh., dans les bois taillis (V. Bn.) aux environs de *Berchem*, *Wilryck*, *Contich*, etc., (nob.) ②. 5.
504. *Hydrocotyle vulgaris* L., dans les marais et les bords des fossés, dans les bruyères de *Brasschaet* et de la Campine (Dk.) ②. 5—7.
505. *Sanicula europæa* L. *S. officinarum* Lam., fl. fr., dans les bois taillis à *Exterlaer* sous *Deurne*, (Dk.) ②. 5—6.
506. *Heracleum sphondylium* L. *H. branca* Scop., croît partout dans les prés secs et les bords des champs, surtout dans les environs de la ville (Dk.) ②. 6—7.
507. *Oenanthe fistulosa* L., n'est pas rare sur les bords des eaux stagnantes, et les endroits marécageux près de *Austruweel* et de *Westerloo* (Dk.) ②. 6—7.
508. *Oenanthe phellandrium* Lam. *Phellandrium aquaticum* L., se trouve partout dans les eaux stagnantes (Dk.) ②. 6—8.
509. *Oenanthe peucedanifolia* Poll., dans les prés marécageux et les bords des fossés aux environs de *Tongerloo* (nob.) ②. 6—7.
510. *Torilis anthriscus* Gmel. *Tordylium anthriscus* L., assez commune partout dans les lieux ombragés près des habitations (Dk.) ②. 7—8.
511. *Torilis neglecta* Koch. *Scandix infesta* Jacq., croît sur le glacis de la citadelle près de l'Escaut, rare (nob.) ②. 7—8.
512. *Torilis nodosa* Gaertn. *Tordylium nodosum* L., se trouve sur les digues de l'Escaut et les bords des chemins dans le polder près de *Austruweel* (nob.) ①. 5—6.
515. *Caucalis daucoides* L. *C. leptophylla* Jacq. (V. Bn.) n'appartient pas, quoi qu'on en dise, à la flore de la province d'Anvers

514. *Daucus carota* L., cultivé (Dk.) *β. sylvestris* Dmtr., croît sur le glacis de la ville et dans les prés secs aux environs de *Berchem* (nob.) ②. 6—9
515. *Peucedanum officinale* L., se trouve pêle-mêle avec l'*Arundo phragmites* L., le long de l'Escaut près du fort *Philippe* (nob.) ④. 6—7.
516. *Peucedanum silaus* L. *P. pratense* Lam., fl. fr. C'est sans doute le *Peucedanum palustre* que M. Van Beneden a voulu indiquer. Cette dernière croît aux bords des fossés et des prés entre *Anvers* et *Termonde*, selon M. Kickx.
517. *Conium maculatum* L., dans les lieux frais près des habitations à *Stuyvenberg*, la *Tête de Flandre* et dans le poldre entre *Mervem* (Dk.) ②. 7—8.
518. *Sium latifolium* L. *S. sulcatum* Pers., dans les marécages entre *Westerloo* et *Herselt* et dans ceux de *Oosterloo*, *Vilders*, etc., (Dk.) ④. 7—8.
519. *Sium angustifolium* L. *S. incisum* Pers., croît dans les fossés aux environs de *Berchem*, *Wiltryck* et de *Borgerhout* (V. Bn.) ④. 8—9.
520. *Sium nodiflorum* L. *Seseli nodiflorum* Scop., croît dans le canal de *Herenthals* et les fossés sous *Borgerhout* et *Deurne*, (Dk.) ④. 7—8.
521. *Sium repens* L., dans les marécages entre *Gymel* et *Herselt* dans la Campine (Kx.) ④. 7—8.
522. *Selinum palustre* L. *S. thyselinum* Cr., dans les prés marécageux (V. Bn.) aux environs de *Wechter* et *Tremeloo* (Kx.) ④. 7—8.
523. *Selinum carvifolia* L. *Angelica carvifolia* Spreng., dans les endroits marécageux et les bords des étangs aux environs de *Tongerloo* (Kx.) ④. 7—9.
524. *Angelica archangelica* L., trouvée anciennement par M. Dekin à la *Tête de Flandre* où elle n'existe plus.
525. *Angelica sylvestris* L. *Imperatoria sylvestris* Desf., commune dans les prés et les bois humides aux environs de *Berchem* et *Deurne* (Dk.) ④. 7—8.
526. *Sison inundatum* L. *Sium inundatum* Lam., croît dans les endroits marécageux (Dk.) entre *Wechter* et *Tremeloo* (Kx.) et aux environs de *Westerloo* (nob.) ④. 5—7.
527. *Aethusa cynapium* L., croît partout dans les champs frais et les jardins potagers (Dk.) ①. 6—8.
528. *Scandix pecten* L. *Myrrhis pecten veneris* All., croît dans les champs aux environs de *Berchem* et *Deurne* (Dk.) ①. 6—7.
529. *Chærophyllum sylvestre* L., dans les lieux incultes et sur les bords des champs aux environs de *Borgerhout* et *Deurne* (Dk.) ④. 6—8.
530. *Chærophyllum temulentum* L., croît partout dans les haies et les buissons (Dk.) ②. 6—7.
531. *Chærophyllum cerefolium* Cr. *C. sativum* Gært. *Scandix*

*cerefolium* L., cultivé dans les jardins potagers (V. Bn.) ①. 5—7.

552. *Cicuta virosa* L. *Cicutaria aquatica* Lam. Cette plante est assez commune dans les endroits marécageux de la Campine (Kx.) et dans ceux de *Hoboken*, mais plus rare (nob.) ④. 6—7.

553. *Pastinaca sativa* L., cultivé dans les jardins (Dk.) et à l'état spontané près du fort *Marie* où elle est assez rare (nob.) ②. 7—8.

554. *Aegopodium podagraria* L. *Sison podagraria* Spreng., croît partout dans les lieux frais et ombragés, surtout sous les haies près des habitations ④. 6—8.

555. *Apium graveolens* L., cette plante est très-commune sur les bords de l'Escaut et dans les lieux humides des polders (nob.) ; elle n'est pas mentionnée cependant ni par Dekin ni par Van Beneden. C'est la variété  $\alpha$ . *maritimum* Dmtr., ②. 7—8.

556. *Pimpinella saxifraga* L., croît dans les endroits incultes de la Campine (Dk.) au bois de *Cuytenhoeve* près de *Westerloo* (nob.)  $\delta$ . *dissecta* Spreng., dans les endroits sablonneux entre *Westerloo* et *Herselt* (Kx.) ④. 6—8.

557. *Pimpinella magna* L. *Tragoselinum majus* Lam., fl. fr., croît sur le glacis de la ville près de la lunette *Herenthals*, et dans les prés entre *Borgerhout* et *Berchem* (Dk.) ④. 6—8.

#### PENTANDRIE TRIGYNIE.

558. *Viburnum opulus* L. *V. lobatum* Lam., fl. fr., dans les bois humides et les haies, dans les prés, assez commun partout (Dk.) ⑤. 6.

559. *Sambucus ebulus* L. *S. humilis* Lam., fl. fr., croît sur la digue de l'Escaut entre *Kiel* et *Hoboken* (Dk.) ④. 6—8.

540. *Sambucus nigra* L., dans les bois taillis aux environs de *Tongerloo* et *Zammel* (Dk.), la variété  $\beta$ . *laciniata*, Mill., est cultivée dans les jardins ⑤. 6—7.

541. *Alsine media* L. *A. avicularum* Lam., fl. fr., croît partout dans les jardins et les lieux frais (Dk.) ①. 3—11.

542. *Alsine neglecta* Lej. *A. media*  $\beta$ . *Merat.*, croît dans les endroits humides et ombragés, près des habitations (nob.) ①. 5—7.

543. *Corrigiola littoralis* L., dans les lieux sablonneux et humides aux environs de *Herselt* et de *Everbode* ①. 6—8.

#### PENTANDRIE TETRAGYNIE.

544. *Parnassia palustris* L., dans les endroits marécageux (Dk.) aux environs de *Westwezel*, selon M. le professeur Verbert ④. 7—9.

PENTANDRIE PENTAGYNIE.

545. *Linum catharticum* L., se trouve dans les gazons le long des chemins (Dk.) sur les bords de la chaussée entre *Contich* et *Waelhem* (Kx.) ①. 6—8.
546. *Linum usitatissimum* L., cultivé dans les champs (V. Bn.) ①. 5—7.
547. *Drosera longifolia* L. *D. intermedia* Hayne, croît dans les endroits humides et dans les mères des bruyères de la Campine (Dk.) ②. 7—8.
548. *Drosera rotundifolia* L. *Rossolis rotundifolia* Moench., croît dans les mêmes localités (Dk.) ②. 7—8.
549. *Statice limonium* L. *Limmomonium vulgare* Mill., se trouve sur les bords de l'Escaut près du fort *Philippe* (Dk.) ②. 6—8.
550. *Statice armeria* L. *S. capitata* Lam., fl. fr., sur les bords de l'Escaut près du fort *Lacroix* et de *Lillo* (Dk.) ②. 7—8.

PENTANDRIE POLYGYNIE.

551. *Myosurus minimus* L., se trouve dans les moissons aux environs de *Berchem* (Dk.) ①. 4—6.

HEXANDRIE MONOGYNIE.

552. *Berberis vulgaris* L. (V. Bn.), cultivé.
553. *Leucoium aestivum* L. *Nivaria aestivalis* Moench. Cette belle plante croît pêle-mêle avec l'*Arundo phragmites* sur le bord de l'Escaut près du fort du *Nord*, très-rare (nob.) ②. 5.
554. *Galanthus nivalis* L. (V. Bn.). Où M. Van Beneden peut-il avoir trouvé cette espèce dans nos environs?
555. *Narcissus pseudonarcissus* L. croît dans les environs de *Lierre* (Dk.)? ②. 4—5.
556. *Allium vineale* L., croît dans les prés secs sur le glacis de la ville et les digues de l'Escaut (Dk.) ②. 6—7.
557. *Allium escalonicum* L. (V. Bn.), cultivé.
558. *Allium cepa* L. (V. Bn.), cultivé.
559. *Allium carinatum* L. (V. Bn.), croît dans les bois sablonneux ②. 6—8.
560. *Allium ursinum* L., sur les bords des fossés de la ville (Dk.), hors la porte des légumine (Kx.) ②. 5—6.
561. *Allium sphærocephalum* L., dans les endroits incultes et sablonneux (V. Bn.) ②. 6—8.
562. *Allium sativum* L., cultivé (V. Bn.) ②. 6—7.
563. *Convallaria maialis* L., croît dans les bois taillis et couverts aux



environs de *Wilryck* et aux alentours de l'abbaye de *Everbode* (Dk.) 2<sup>l</sup>. 4—5.

564. *Convallaria bifolia* L. *Mayanthenum bifolium*. Decand., se trouve dans les mêmes localités aux environs de *Wilryck*, *Contich*, *Linth*, *Duffel* (Dk.) et à *Tongerloo* (nob.) 2<sup>l</sup>. 5—6.
565. *Convallaria multiflora* L. *Polygonatum multiflorum* Moench. Cette espèce est commune dans les bois ombragés (Dk.) 2<sup>l</sup>. 5—6.
566. *Convallaria lanceolata*.....? Qu'est-ce que cette plante? où M. Van Beneden a-t-il jamais rencontré ce nom?
567. *Hyacinthus non scriptus* L. H. *pratensis* Lam., dans les bois ombragés aux environs de *St-Bernard* (Dk.).
568. *Hyacinthus racemosus* L. H. *juncifolius* Lam., croit dans les champs et les bois taillis aux environs de *Wilryck* et de *Berchem* (Dk.) 2<sup>l</sup>. 4—5.
569. *Hyacinthus botryoïdes* L. *Muscaria botryoïdes* Mill. (V. Bn.) c'est sans doute la plante cultivée.
570. *Anthericum ossifragum* L. *Abama ossifraga* Adans., croit dans les endroits humides des bruyères (Dk.) entre *Gheel* et *Dessel* (nob.) 2<sup>l</sup>. 7—8.
571. *Ornithogalum umbellatum* L., plante assez commune partout dans les moissons et les bois taillis (Dk.) 2<sup>l</sup>. 5—6.
572. *Ornithogalum minimum* L., croit dans les champs cultivés (V Bn.) 2<sup>l</sup>. 4.
573. *Asparagus officinalis* L., cultivée dans les jardins (Dk.) à l'état spontané, près du ford *St-Hilaire* à la *Tête de Flandre* (nob.) 2<sup>l</sup>. 6—8.
574. *Fritillaria meleagris* L. (V. Bn.). Jusqu'ici nous n'avons pas encore rencontré cette plante dans notre province; M. Kickx, père, l'avait observée aux environs de *Dilbeck* où elle est assez rare.
575. *Tulipa sylvestris* L., croit à l'état spontané sur la digue de l'Escaut entre *Kiel* et *Hoboken* (Dk.) et sur le bastion de *Tolède* à la citadelle (nob.) 2<sup>l</sup>. 4—5.
576. *Acorus calamus* L., dans les endroits marécageux (Dk.) entre *Tongerloo* et *Zammel* et dans les fossés de l'abbaye de ce dernier village (nob.) 2<sup>l</sup>. 6—7.
577. *Luzula vernalis* Decand. *Juncus pilosus* L., croit dans les bois au printemps (V. Bn.) 2<sup>l</sup>.
578. *Luzula campestris* Decand. *Juncus campestris* L. J. *nemorosus* Host. Cette plante est assez commune partout (Dk.) 2<sup>l</sup>. 5—6.
579. *Luzula maxima* Decand. *Juncus sylvaticus* Curt., dans les bois couverts et humides de *Beverloo* (Westend.) et de *Tongerloo* (nob.) 2<sup>l</sup>. 5—6.
580. *Luzula multiflora* Lej. *Juncus multiflorus* Desf., dans les endroits humides et marécageux de la Campine (nob.) 2<sup>l</sup>. 6—8.
581. *Luzula congesta* Lej. *Juncus congestus* Thuill., dans les bois couverts de *Everbode* et de *Cuytenhoeve* près de *Westerloo*, très-rare (nob.) 2<sup>l</sup>. 6—8.

582. *Juncus sylvaticus* Roth. *J. acutiflorus* Ehrh., croit dans les endroits marécageux (V. Bn.) 2. 6—8.
583. *Juncus lampocarpus* Ehrh., dans les endroits marécageux, dans la bruyère entre *Herenthals* et *Gheel* (Kx.) 2. 6—8.
584. *Juncus uligenosus* Roth. *J. subverticillatus* Wulf., croit dans les lieux incultes et humides entre *Oevel* et *Tongerloo* (Kx.). La variété  $\delta$ . *fluitans* Dmtr., dans les endroits marécageux (nob.) 2. 7—9.
585. *Juncus obtusiflorus* Ehrh. *J. articulatus* L., assez commune dans les prés humides de la Campine (Dk.) 2. 6—7.
586. *Juncus pygmeus* Thunb. *J. nanus* Dub., croit dans les endroits humides des bruyères de la Campine, surtout entre *Gheel* et *Eyndhout* et entre *Westerloo* et *Westmeerbeeck* (Kx.) ①. 6—8.
587. *Juncus Tenageia* Ehrh., dans les endroits marécageux entre *Gymel* et *Herselt* (Kx.) ①. 6—8.
588. *Juncus bufonius* L., vient partout dans les champs humides (Dk.) ①. 6—8.
589. *Juncus tenuis* Willd. *J. bicornis* Mich., dans les endroits humides et marécageux dans la bruyère aux environs de *Gheel* (Kx.) 2. 5—6.
590. *Juncus squarrosus* L. *J. sprengelii* Willd., croit partout dans les lieux sablonneux, humides, surtout après les défrichements des bois de sapin dans la Campine (Dk.) 2. 6—8.
591. *Juncus effusus* L., croit partout dans les prés secs, surtout dans environs de *Wiltryck* (Dk.) 2. 6—7.
592. *Juncus conglomeratus* L., vient dans les mêmes localités (Dk.) 2. 6—7.
593. *Juncus filiformis* L., dans les endroits tourbeux aux environs de *Gheel* (Kx.) 2. 6—7.
594. *Juncus glaucus* Ehrh. *J. inflexus* Leers. non L., dans les endroits incultes et humides (V. Bn.) 2. 6—7.
595. *Juncus bulbosus* L. *J. compressus* Jacq., dans les lieux sablonneux, là où l'eau a séjourné pendant l'hiver aux environs de *Berchem* (Dk.) 2. 6—7.
596. *Juncus gerardi* Lois. *J. bulbosus*  $\beta$ . *gerardi* Lej. et Court. comp. Cette espèce est assez commune sur les bords de l'Escaut (nob.) 2. 6—7.
597. *Juncus fluitans*? (V. Bn.). C'est sans doute notre variété. *J. uligenosus*  $\delta$ . *fluitans* Dmtr.
598. *Peplis portula* L. *Portula diffusa* Moench., croit dans les lieux humides, les bords des étangs et des fossés, très-commune dans la Campine. (Dk.) ①. 6—8.

#### HEXANDRIE TRIGYNIE.

599. *Colchicum autumnale* L., croit dans les prés (Dk.). C'est à M. Hermus, pharmacien à Anvers, que nous devons la connaissance de

cette plante qu'il a trouvée dans les prés entre *Gheel* et *Merhout*, non loin des marécages de *Wilders* 24. 9—10.

400. *Triglochin maritimum* L. Cette plante est très-commune sur les bords de l'Escaut (Dk.) 24. 6—8.
401. *Triglochin palustre* L., dans les mâres et les prés humides entre *Kiel* et *Hoboken* (Dk.) et dans les lieux tourbeux entre *Gheel* et *Lichtaert* dans la Campine (nob.) 24. 6—8.
402. *Rumex aquaticus* L. *R. britannica* Huds., croît partout sur les bords des eaux stagnantes (Dk.) 24. 6—8.
403. *Rumex crispus* L., commune dans les lieux incultes près des habitations, et les prés (Dk.) ②. 6—8.
404. *Rumex obtusifolius* L., dans les prés ombragés (Dk.) ②. 6—8.
405. *Rumex sanguineus* L., croît dans les prés et les endroits cultivés humides (Dk.), rare 24. 6—7.
406. *Rumex acutus* L., commune dans les champs frais aux environs de *Deurne* et *Borgerhout* (Dk.) 24. 6—7.
407. *Rumex maritimus* L. *Lapathum minus* Lam., fl. fr., croît dans le poldre à la Tête de Flandre et le long de l'Escaut près du fort Philippe (Dk.) ①. 7—9.
408. *Rumex pratensis* M. et K., croît dans les prés ombragés aux environs de *Edeghem* et du *Vieux-Dieu* (nob.) 24. 6—7.
409. *Rumex acetosa* L. *Lapathum pratense* Lam., fl. fr., se trouve partout dans les prés et les endroits humides (Dk.) 24. 6—7.
410. *Rumex acetosella* L. *Lapathum arvense* Lam., fl. fr., partout dans les champs sablonneux (Dk.) 24. 5—9.

#### HEXANDRIE POLYGYNIE.

411. *Alisma plantago* L., sur les bords des fossés et des eaux stagnantes (Dk.)  $\beta$ . *lanccolatum*. Dmtr., dans les fossés le long du chemin de fer sous *Berchem* (nob.) 24. 6—8.
412. *Alisma natans* L., dans les fossés et ruisseaux aux environs de *Westerloo* et de *Tongerloo* (Dk.)  $\beta$ . *heterophyllum* Dmtr., sur les bords des étangs entre *Herenthals* et *Lichtaert* (nob.) 24. 6—8.
413. *Alisma ranunculoïdes* L., croît dans les mâres de la Campine (Dk.) et sur les bords des étangs entre *Westerloo* et *Westmeerbeek* (Kx.) 24. 6—8.

#### HEPTANDRIE MONOGYNIE.

414. *Aesculus hippocastanum* L., cultivé dans les bois particuliers (Dk.) D. 5.

OCTANDRIE MONOGYNIE.

415. *Epilobium spicatum* Lam. *E. angustifolium* L., croit dans les endroits sablonneux ombragés entre *Berchem* et *Borsbeeck* (Dk.) et dans les environs de *Westerloo*, dans la Campine 24. 7—8. Cette espèce forme un double emploi dans la Flore de M. Van Beneden, où elle est mentionnée en sus de son synonyme *E. angustifolium*..
416. *Epilobium hirsutum* L. *E. grandiflorum* Hoffm., dans les endroits ombragés et humides (Dk.) aux environs de *Tongerloo* (nob.) 24. 7—8.
417. *Epilobium parviflorum* Schreb. *E. pubescens* Roth. *E. molle* Lam., dans les lieux humides et ombragés (V. Bn.), assez commune dans les environs de *Berchem* 24. 7—8. On confond souvent cette espèce avec l'*E. montanum* L.
418. *Epilobium umbrosum* Dmtr., croit dans les endroits humides et ombragés entre *Berchem* et *Borsbeeck* (nob.) 24. 6—8.
419. *Epilobium montanum* L., dans les endroits ombragés près du *Vieux-Dieu* (Dk.) 24. 6—9.
420. *Epilobium tetragonum* L., se trouve dans les lieux marécageux (V. Bn.) 24. 7—8.
421. *Epilobium palustre* L., vient dans les mêmes localités (Dk.) et sur les bords des étangs entre *Westerloo* et *Herselt* (Kx.) 24. 7—8.
422. *Oenothera biennis* L., croit à l'état spontané sur le glacis de la citadelle du côté de *Kiel* (Dk.) et aux alentours de l'abbaye de *Tongerloo* (nob.) 24. 6—8.
423. *Vaccinium myrtillus* L., croit partout dans les lieux secs (Dk.) 24. 4—5.
424. *Vaccinium aligenosum* L., dans les endroits humides et spongieux aux environs de *Tongerloo* (nob.) 24. 4—6.
425. *Vaccinium vitisidæa* L. *V. punctatum* Lam., observé entre *Gheel* et *Meerhout* par M. Verbert, aux environs de *Schrick* par M. Donkelaar, père, et dans le bois de *Tongerloo* (nob.) 24. 5—11.
426. *Oxycoccus palustris* Pers. *Vaccinium oxycoccus* L., croit dans les tourbières entre *Gheel* et *Meerhout* et dans les endroits spongieux du bois de *Tongerloo* (nob.) 24. 5—8.
427. *Erica vulgaris* L. *Caluna vulgaris* Salisb., dans les lieux arides et incultes, commune partout (Dk.) 24. 8—9.
428. *Erica tetralix* L., les endroits humides dans les bruyères (Dk.) 24. 7—8.

OCTANDRIE TRIGYNIE.

429. *Polygonum fagopyrum* L., cultivé dans les champs sablonneux de la Campine (V. Bn.) 24. 7—8.

450. *Polygonum tartaricum* L. *Fagopyrum dentatum* Moench., croit pêle-mêle avec la précédente (nob.) ①. 7—8.
451. *Polygonum convolvulus* L., croit dans les haies et les bois taillis, assez commune (Dk.) ①. 6—8.
452. *Polygonum dumetorum* L., se trouve dans les mêmes localités (V. Bn.) ①. 6—8.
453. *Polygonum aviculare* L. *P. centinodium* Lam., fl. fr., croit partout le long des chemins et dans les rues peu fréquentées (Dk.) ①. 6—9.
454. *Polygonum minus* Huds. *P. angustifolium* Roth., croit dans les endroits sablonneux et humides aux environs de *Westerloo* (nob.) ①. 7—8.
455. *Polygonum hydropiper* L., se trouve dans les endroits humides, assez commune (Dk.) ①. 8—9.
456. *Polygonum laxiflora* Weihe., dans les fossés aux environs de *Berchem* (nob.) ①. 8—9.
457. *Polygonum persicaria* L., dans les lieux humides et incultes près des habitations (Dk.) ①. 7—9.
458. *Polygonum lapathifolium* L., se trouve dans les champs humides aux environs de *Berchem* et dans la *Campine* (nob.) ①. 7—9.
459. *Polygonum amphibium* L., dans les étangs et les eaux stagnantes (Dk.) β. *terrestre* Willd., aux environs de *Eyndhout* dans la *Campine* (Kx.) ①. 7—9.
440. *Polygonum bistorta* L., croit dans les endroits ombragés de *Wilrych* et de *Berchem* (Dk.), à *Rethy* et *Tongerloo* dans la *Campine* (nob.) ④. 5—7.

#### OCTANDRIE TETRAGYNIE.

441. *Adoxa moschatellina* L., croit partout dans les lieux humides et ombragés sous *Berchem* et *Deurne* (Dk.) ④. 4—5.
442. *Elatine hexandra* Decand., sur les bords des fossés des endroits marécageux entre *Tongerloo* et *Zammel*, très-rare (nob.) ①. 8—10.
443. *Elatine triandra* Schk. *E. hydropiper* L., croit sur les bords des mares (V. Bn.) ①. 7—8.
444. *Paris quadrifolia* L., se trouve dans les bois couverts entre *Wilrych* et *Edegghem*, assez rare (Dk.) ④. 4—5.

#### ENNÉANDRIE HEXAGYNIE

445. *Butomus umbellatus* L. *B. floridus* Gaertn. Cette belle plante est assez commune dans les eaux stagnantes et les fossés (Dk.) ④. 6—8.

DÉCANDRIE MONOGYNIE.

446. *Monotropa hypopithys* L., croît sur la racine des arbres, très-rare (Dk.) 24. 6—7.
447. *Pyrola rotundifolia* L. *P. major* Lam., fl. fr., se trouve dans les bois ombragés (Dk.) entre *Tongerloo* et *Gheel* où elle est très-rare (nob.) 24. 5—7.
448. *Pyrola minor* L., croît également dans les bois couverts (V. Bn.) 24. 5—7.
449. *Andromeda polifolia* L. Cette belle plante croît pêle-mêle avec l'*Oxyccocos palustris*, dans les endroits spongieux entre *Gheel* et *Meerhout*. C'est à M. Verbert que nous devons la connaissance de cette espèce observée par lui il y a plusieurs années; nous l'avons cueillie dans la même localité au mois de septembre dernier 24. 5—8.

DÉCANDRIE DIGYNIE.

450. *Scleranthus annuus* L., se trouve partout dans les champs sablonneux (Dk.) ①. 6—9.
451. *Scleranthus perennis* L., croît dans les lieux sablonneux et peu humides (Dk.) surtout entre *Wilders* et *Eyndhout* dans la Campine (Kx.) 24. 9—10.
452. *Chrysosplenium alternifolium* L., dans les endroits ombragés et humides (Dk.) 24. 4—5.
453. *Chrysosplenium oppositifolium* L., croît dans les mêmes localités (Dk.) 24. 4—5.
454. *Saxifraga granulata* L., dans les prés secs et sur les bords des champs aux environs du *Vieux-Dieu* et de *Bouchout* (Dk.) 24. 5—6.
455. *Saxifraga tridactylites* L., croît sur les vieux murs et les endroits sablonneux (Dk.) entre *Berchem* et *Wiltryck*, assez rare (nob.) ①. 4—5.
456. *Gypsophylla muralis* L. *Saponaria muralis* Lam., fl. fr., dans les champs sablonneux (Dk.) entre *Herenthout* et *Morkhoven* (nob.) ①. 7—9.
457. *Saponaria officinalis* L., sur les bords des champs, près du fort *Carnot* à *Stuyvenberg*, sur la digue de l'Escaut près de *Kiel* (Dk.). La variété à fleurs pleines se trouve dans les mêmes localités 24. 6—8.
458. *Dianthus armeria* L., sur les bords des champs sablonneux (Dk.) près de l'abbaye de *Everbode* (Kx.) ①. 7—8.
459. *Dianthus prolifer* L., croît dans les endroits sablonneux (Dk.) aux environs de *Bonheyde* (Kx.) ①. 6—8.
460. *Dianthus deltoïdes* L., dans les lieux secs et sablonneux (V. Bn.) 24. 6—9.

DÉCANDRIE TRIGYNIE.

461. *Arenaria serpyllifolia* L., dans les champs cultivés aux environs de Berchem (Dk.)  $\beta$ . *tenuior* Koch, dans les champs humides aux environs de Merxem (nob.) ①. 5—7.
462. *Arenaria trinervia* L. *Alsine trinervia* Schreb., dans les lieux ombragés, humides aux environs de Merxem, Deurne et Berchem (Dk.) ②. 4—6.
463. *Arenaria tenuifolia* L., dans les champs aux environs de Merxem et Deurne (Dk.) ①. 6—8.
464. *Arenaria segetalis* Lam., fl. fr., *Alsine segetalis* L., croît dans les champs aux environs de Duffel, assez rare (nob.) ①. 6—7.
465. *Arenaria rubra* L. *Alsine rubra* Schreb., croît partout dans les lieux sablonneux et peu humides (Dk.)  $\beta$ . *marina* Willd., sur les bords de l'Escaut près de Lillo (nob.) ①. 6—8.
466. *Arenaria media* L. non Poll., sur les bords de l'Escaut près du fort Philippe (nob.) ①. 6—8.
467. *Stellaria graminea* L., dans les endroits humides peu ombragés, et sur les bords des champs (Dk.) ②. 6—8.
468. *Stellaria holostea* L., croît partout dans les bois taillis et les endroits ombragés (Dk.) ②. 4—6.
469. *Stellaria glauca* With. *S. palustris* Retz., dans les lieux humides et couverts au bois de Tongerlo (nob.) ②. 6—7.
470. *Stellaria nemorum* L. *Alsine nemorum* Schreb., les lieux couverts dans la forêt de Tongerlo (Dk.) ②. 5—8.
471. *Larbræa aquatica* St. Hill., croît dans les champs humides de la Campine (Dk.), et sur les bords des fossés aux environs de Berchem (nob.) ①. 5—6.
472. *Cucubalus behen* L. *Silene inflata* Smith., croît sur les bords des champs et des chemins entre Boom et Duffel (Kx.) ②. 6—8.
473. *Silene conoidea* L. non Huds. *Cucubalus conicus* Lam., fl. fr., dans les endroits cultivés, sablonneux (Dk.) ①. 6—7.
474. *Silene conica* L., croît dans les champs sablonneux (V. Bn.) ①. 6—7.
475. *Silene gallica* L., croît dans les champs humides aux environs de Tongerlo (Kx.), mais non à Waelhem comme le dit M. Van Beneden dans sa flore de la province d'Anvers, ①. 6—8.

DÉCANDRIE PENTAGYNIE.

476. *Sedum thelephium* L. *Anacampseros vulgaris* Haw., assez commun dans les endroits humides ombragés (Dk.) ②. 7—8.
477. *Sedum dasphyllum* L. *S. glaucum* Lam., fl. fr. Cette belle espèce croissait sur la vieille porte de Bruxelles, à Malines, très-rare (nob.) ②. 6—7.



478. *Sedum album* L., le long des chemins dans les endroits pierreux entre *Everbode* et *Diest* (Dk.) 24. 6—7.
479. *Sedum cepaea* L. *S. paniculatum* Lam., fl. fr. (V. Bn.). Cette plante ne peut pas être considérée comme spontanée dans notre province.
480. *Sedum acre* L., croît sur le glacis de la citadelle et de la ville (Dk.) les bords des chemins aux environs de *Lierre* et de *Tongerloo* (nob.) 24. 6—7.
481. *Sedum reflexum* L. non *Decand.*, sur les remparts de la ville (Dk.), et dans les environs de *Everbode* (Kx.). *β. glaucum* Lej. et *Court.*, près de la porte St-George, rare (nob.) 24. 7—8.
482. *Spergula arvensis* L., cultivé et à l'état spontané partout dans les champs (Dk.) ①. 6—9.
483. *Spergula maxima* Weihe., les moissons dans la Campine (nob.) ①. 5—6.
484. *Spergula pentandra* L., les champs sablonneux aux environs de *Wiltryck* et de *Contich* (nob.) ①. 4—6.
485. *Spergula nodosa* L. *S. palustris* Pers., sur les bords des mares dans les bruyères (Dk.) entre *Gheel* et *Lichtaert* (nob.) 24. 6—9.
486. *Cerastium arvense* L. *Centunculus arvensis* Scop., croît partout dans les champs cultivés (Dk.) 24. 4—6.
487. *Cerastium viscosum* L., dans les champs sablonneux aux environs de *Merxem* (Dk.) 24. 5—9.
488. *Cerastium vulgatum* L. *C. ovale* Pers., très-commune dans les champs cultivés (Dk.) ①. 5—10.
489. *Cerastium semidecandrum* L. *C. obtusifolium* Lam., fl. fr., dans les endroits sablonneux (Dk.) aux environs de *Deurne* et *Borsbeeck* (nob.) ①. 4—6.
490. *Cerastium aquaticum* L. *Myosanthus aquaticus* Desf., sur les bords des fossés dans les prés entre *Berchem* et *Borgerhout* (Dk.) et dans la forêt de *Tongerloo* (nob.) 24. 6—8.
491. *Agrostema githago* L. *Githago segetum* Desf., croît dans les moissons aux environs de *Deurne*, *Contich* et *Wiltryck* (Dk.) ①. 6—7.
492. *Lychnis flosculi* L. *L. lacineata* Lam., fl. fr., croît partout dans les prés humides (Dk.) 24. 5—7.
493. *Lychnis dioica* L. *L. alba* Mill., commune sur le glacis de la citadelle et les champs aux environs de *Wiltryck* (Dk.) 24. 6—7.
494. *Lychnis sylvestris* Skhr. *L. dioica β. rubra* L., dans les endroits humides et ombragés et les bords des fossés aux environs de *Wiltryck* et *Berchem* (nob.) 24. 6—7.
495. *Oxalis acetosella* L. *Oxys alba* Lam., fl. fr., dans les bois couverts, humides entre *Wiltryck* et *Edegghem* (Dk.) et dans la forêt de *Tongerloo* où elle est très-commune (nob.) 24. 4.
496. *Oxalis corniculata* L. *Oxys lutea* Lam., fl. fr., dans les champs et les jardins potagers aux environs de *Berchem* et *Wiltryck* (Dk.) ①. 6—8.

497. *Oxalis stricta* L. *O. ambigua* Salisb., dans les champs aux environs de Tongerlo et de Westerloo (nob.) 2. 5—9.

DODÉCANDRIE MONOGYNIE

498. *Portulaca oleracea* L., cultivée dans les jardins potagers (V. Bn.).  
499. *Lythrum salicaria* L. *Salicaria spicata* Lam., fl. fr., dans les prés et les bords des fossés, dans les lieux humides (Dk.) 2. 6—7.

DODÉCANDRIE DIGYNIE.

500. *Agrimonia eupatorium* L., croît sur les digues de l'Escaut (Dk.) et aux alentours de l'abbaye de Everbode (Kx.) 2. 6—7.

DODÉCANDRIE TRYGINIE.

501. *Reseda luteola* L., vient sur les terrains nouvellement remués (Dk.), le long du chemin de fer près de Mortsel (nob.) 2. 6—8.  
502. *Reseda lutea* L. (V. Bn.), ne croît pas dans la province.  
503. *Euphorbia helioscopia* L., commune dans les champs frais et les jardins potagers (Dk.) ①. 6—8.  
504. *Euphorbia lathyris* L. *Tithymalus lathyris* Lam., fl. fr., vient quelquefois dans les jardins à l'état spontané (V. Bn.) 2. 7—8.  
505. *Euphorbia sylvatica* L. (V. Bn.), ne croît pas dans la province d'Anvers.  
506. *Euphorbia esula* L., dans les endroits humides (V. Bn.), sur le glacis de la lunette du Kiel (nob.) 2. 5—8.  
507. *Euphorbia exigua* L., dans le poldre aux environs de Oorderen et Wilmarndonck (Dk.) ①. 7—9.  
508. *Euphorbia peplus* L. *E. oleracea* Pers., croît dans les champs frais et les jardins potagers (Dk.) ①. 7—9.

DODÉCANDRIE DODÉCAGYNIE.

509. *Sempervivum tectorum* L., croît sur les toits de chaume dans la Campine (Dk.) 2. 7—8.

ICOSANDRIE MONOGYNIE.

510. *Amygdalus persica* L. (V. Bn.), cultivé.  
511. *Prunus armeniaca* L. (V. Bn.) cultivé.  
512. *Prunus padus* L. *P. racemosa* Lam., fl. fr., dans les bois et les haies (V. Bn. ?) aux environs de Herselt dans la Campine, assez rare ? (nob.) 2. 5—6.

515. *Prunus mahaleb* L. *P. odorata* Lam., fl. fr., (V. Bn.), cultivée.  
 514. *Prunus avium* L. *P. sylvestris* Pers., dans les bois aux environs de *Wilryck*, et dans la Campine (Dk.) D. 5.  
 513. *Prunus spinosa* L., dans les bois et les haies aux environs de *Wilryck* et les lieux incultes dans la Campine (Dk.) D. 5—4.  
 516. *Prunus domestica* L. *P. communis* Huds., cultivé (Dk.) et à l'état spontané, aux alentours de l'abbaye de *Tongerloo* (nob.) D. 5.

ICOSANDRIE DIGYNIE.

517. *Crataegus oxyacantha* L., croit à l'état spontané dans les bois et les haies dans la Campine, et cultivé pour former des haies autour des jardins D. 5.

ICOSANDRIE TRIGYNIE.

518. *Sorbus aucuparia* L. *Mespilus aucuparia* Scop., croit partout dans les bois (Dk.) D. 5—6.

ICOSANDRIE PENTAGYNIE.

519. *Mespilus germanica* L., dans les haies et les bois dans la Campine, et aux environs de *Wilryck* (Dk.) D. 5.  
 520. *Pyrus communis* L., cultivé (Dk.). Croissait, il y a quelques années, à l'état spontané dans le bois de *Tongerloo*, détruit par le défrichement que cette belle forêt a subi depuis peu d'années, (nob.) D. 4—5.  
 521. *Pyrus malus* L. *Malus communis* Desf., cultivé, et à l'état sauvage entre *Herselt* et *Aerschot* (Dk.) D. 5.  
 522. *Pyrus Cydonia* L. *Cydonia vulgaris* Pers. (V. Bn.), cultivé.  
 523. *Spiræa ulmaria* L. *Ulmia palustris* Moench., croit sur les bords des fossés dans les prés et endroits humides (Dk.) D. 6—7.  
 524. *Spiræa filipendula* L. (V. Bn.). Cette plante est cultivée dans les jardins particuliers, mais n'est pas à l'état spontané dans notre province.

ICOSANDRIE POLYGYNIE.

525. *Rosa rubigenosa* L., dans les haies et les bois taillis (Dk.) D. 6.  
 526. *Rosa tomentosa* Smith, dans les bois humides et ombragés aux environs de *Schooten*, très-rare (nob.) D. 6.  
 527. *Rosa arvensis* L., sur la digue près du fort *Philippe* (Dk.) D. 6—7.  
 528. *Rubus idæus* L., dans les bois couverts et humides (Dk.), surtout à *Tongerloo* dans la Campine (nob.) D. 5—6.

529. *Rubus fruticosus* L., croît sur les bords des champs sablonneux et les endroits stériles (Dk.) f. 6—7.
530. *Rubus caesius* L., croît dans les lieux couverts et humides (Dk.) f. 5—7.
531. *Tormentilla erecta* L., croît partout dans les bois, aux environs des bruyères et les endroits sablonneux incultes (Dk.).
532. *Fragaria vesca* L. *F. vulgaris* Ehrh., dans les lieux ombragés, humides aux environs de Wiltryck, Edegghem et à Tongerlo dans la Campine (Dk.) 2. 5—6.
533. *Fragaria sterilis* L. *Potentilla fragariastrum* Ehrh., dans les endroits sablonneux, ombragés, entre Berchem et Wiltryck, assez rare (Dk.) 2. 5—6.
534. *Potentilla anserina* L. *Argentina vulgaris* Lam., fl. fr., croît partout le long des chemins dans les endroits humides, (Dk.) 2. 5—7.
535. *Potentilla reptans* L. *Fragaria pentaphyllum* Crantz., sur le glacis de la ville et le long des fossés, assez commune partout (Dk.) 2. 6—8.
536. *Potentilla verna* L. *Fragaria verna* Crantz., croît dans les lieux incultes (Dk.) aux environs de Westmael (Kx.) 2. 4—6.
537. *Potentilla argentea* L. *Fragaria argentea* Crantz., croît aux alentours et dans l'intérieur de la citadelle (Dk.), et sur les bords des chemins, près de l'abbaye de Everbode (Kx) 2. 5—8.
538. *Geum urbanum* L. *Caryophyllata vulgaris* Lam., fl. fr., croît partout dans les endroits frais et ombragés (Dk.) 2. 5—7.
539. *Comarum palustre* L., dans les endroits marécageux (Dk.), aux environs de Westerloo (Kx.) 2. 6—7.

POLYANDRIE MONOGYNIE.

540. *Papaver argemone* L. *P. clavigerum* Lam., fl. fr., dans les champs sablonneux aux environs de Berchem et Mortsel, dans la Campine (Dk.) ①. 6—8.
541. *Papaver hybridum* L., dans les moissons aux environs de Berchem (V. Bn.) ①. 6—8.
542. *Papaver dubium* L. *P. parviflorum* Lam., fl. fr., dans les moissons et les bords du chemin de fer sous Berchem (Dk.) ①. 6—8.
543. *Papaver rhæas* L., très-commun partout dans les moissons ①. 6—9.
544. *Papaver somniferum* L., cultivé dans les champs surtout aux environs de Malines (Dk.) ①. 6—7.
545. *Chelidonium majus* L. non Mill., commune dans les lieux frais près des habitations (Dk.).
546. *Tilia parvifolia* Hoffm. *T. microphylla* Vent., dans la forêt aux alentours de l'abbaye de Everbode (Kx.) f. 7.
547. *Tilia vulgaris* Hayne. *T. europea* L., cultivé dans les bois particuliers et le long des chemins (Dk.) f. 6—7.

548. *Tilia platyphyllos* Scop. *T. paniculata* Hayne., cultivé (V. Bn.)  
 5. 5—6.  
 549. *Nymphaea lutea* L., dans les fossés et les eaux stagnantes (Dk.) 24.  
 6—7.  
 550. *Nymphaea alba* L., dans les eaux stagnantes entre *Austruweel* et  
*Eeckeren* (Dk.) et dans les étangs près de *Westerloo* (nob.) 24.  
 6—8.

POLYANDRIE TRIGYNIE.

551. *Delphinium consolida* L. *D. segetum* Lam., fl. fr., dans les  
 moissons (Dk.) aux environs de *Borgerhout* en 1822 (Kx.) très-  
 rare aujourd'hui ①. 6—7.  
 552. *Aquilegia vulgaris* L. (V. Bn.), cultivé.

POLYANDRIE HEXAGYNIE.

553. *Stratiotes aloides* L., dans les eaux stagnantes aux environs de  
*Berchem* et de *Merxem* (Dk.) 24. 6—8.

POLYANDRIE POLYGYNIE.

554. *Clematis vitalba* L., dans les bois (Dk.). Cette plante ne croît plus  
 aujourd'hui dans notre province.  
 555. *Thalictrum flavum* L., croît dans les mares entre *Wechter* et  
*Tremeloo* (Kx.) entre *Oosterloo* et *Eyndhout*, et les prés maré-  
 cageux entre *Deurne* et *Borsbeek* (nob.) 24. 6—7.  
 556. *Caltha palustris* L., croît dans les prés inondés pendant l'hiver et  
 sur les bords de l'Escaut (Dk.) 24. 5—6.  
 557. *Anemone nemorosa* L., commune dans les bois couverts et humi-  
 des (Dk.) 24. 5—5.  
 558. *Anemone ranunculoïdes* L., croît sur les bords de la Nèthe près  
 de *Lierre* (Dk.) 24. 4—5.  
 559. *Ranunculus lingua* L. *R. longifolius* Lam., fl. fr., croît dans  
 les marécages de *Wilders* près de *Gheel* (Kx.) 24. 6—8.  
 560. *Ranunculus flammula* L., dans les mares, les bords des fossés, dans  
 les lieux humides (Dk.) 24. 6—8.  
 561. *Ranunculus sceleratus* L., dans les fossés et endroits inondés  
 pendant l'hiver, assez commune (Dk.) ①. 5—7.  
 562. *Ranunculus acris* L., partout dans les prés secs et sur le glacis  
 de la ville (Dk.) 24. 5—7.  
 563. *Ranunculus polyanthemus* L., sur les remparts de la ville d'*An-  
 vers* (Dk.) nous ne l'avons plus retrouvée depuis. 24. 6—7.  
 564. *Ranunculus repens* L., les champs humides dans le poldre près  
 d'*Austruweel* et sous *Berchem* (Dk.) *β. prostratus* Lej. et  
*Court.*, fl. belg., sur les bords des champs aux environs de *Ber-*

- chem* (nob.)  $\beta$ . *erectus* Decand., dans les fossés près de *Exterlaer* (nob.) 24. 5—8.
565. *Ranunculus philonotis* Willd., croît dans les champs frais aux environs de *Wiltryck*, le plus souvent pêle-mêle avec le *Trifolium pratense* (nob.) ② 5—7.
566. *Ranunculus bulbosus* L., croît dans les prés secs et sur le glacis de la ville (Dk.) 24. 5—7.
567. *Ranunculus arvensis* L. R. *echinatus* Cr., dans les moissons aux environs de *Berchem* et de *Borgerhout* (Dk.) ①. 5—7.
568. *Ranunculus hederaceus* L., croît dans endroits inondés (V. Bn.) 24. 4—8.
569. *Ranunculus aquatilis* L. R. *heterophyllus* Hoffm., dans les fossés et les eaux stagnantes (Dk.)  $\beta$ . *cæspitosus* Decand., dans les fossés près du fort du nord (nob.) 24. 5—7.
570. *Ranunculus heterophyllus*? (V. Bn.). L'absence de toute synonymie nous fait supposer que c'est le *R. aquatilis* L. déjà inscrit par Dekin.
571. *Ficaria ranunculoïdes* Moench. *Ranunculus ficaria* L., croît partout sur les bords des fossés dans les lieux frais et ombragés (Dk.) 24. 5—5.

#### DIDYNAMIE GYMnosPERMIE.

572. *Leonurus cardiaca*. L. *Cardiaca trilobata* Lam., fl. fr., dans les endroits ombragés et incultes près des habitations (Dk.) entre *Herselt* et *Aerschot* (nob.) 24. 6—8.
575. *Glechoma hederacea* L., très-commune partout dans les lieux frais et ombragés (Dk.) 24. 4—6.
574. *Mentha rotundifolia* L. M. *rugosa* Lam., fl. fr., croît dans les prés humides (Dk.) très-rare aujourd'hui. 24. 7—9.
575. *Mentha dulcissima* Dmtr. Prodrom., dans les endroits incultes près des habitations dans la Campine (nob.) 24. 7—9.
576. *Mentha nemorosa* Willd., sur les bords des fossés près de la lunette *St-Laurent*, très-rare (nob.) 24. 7—9.
577. *Mentha sylvestris* L., les endroits humides et ombragés (Dk.) aux environs de *Tongerloo* (nob.) 24. 7—9.
578. *Mentha aquatica* L., dans les lieux humides et marécageux de la Campine (Dk.) 24. 7—9.
579. *Mentha paludosa* Schreb. Tin. Choix des pl. n° 752, les fossés dans les prés entre *Contich* et *Linthout* (nob.) 24. 7—9.
580. *Mentha hirsuta* L. M. *aquatica* Huds. non L., les bords des fossés dans les endroits humides à *Berchem*,  $\beta$ . *aquatica* Lej. et Court., dans les fossés le long du chemin de fer sous *Mortsel* (nob.) 24. 7—9.
581. *Mentha sativa* L., dans les lieux humides et sablonneux près des marécages de *Wilders* dans la Campine (Kx.) 24. 7—9.

582. *Mentha arvensis* L., croît dans les champs dans la Campine (Dk.) 2. 6—9.
583. *Mentha pulegium* L., croît dans les champs humides (V. Bn.) 2. 7—8.
584. *Teucrium chamæpithys* L. (V. Bn.). Cette plante devra probablement être rayée de la liste des plantes spontanées de la province.
585. *Teucrium scordium* L. *T. palustre* Lam., fl. fr., croît dans les endroits marécageux (V. Bn.) 2. 7—9.
586. *Teucrium scordonia* L. *T. sylvestre* Lam., fl. fr., croît partout dans les bois secs et montueux (Dk.) 2. 7—8.
587. *Teucrium chamædryas* L., dans les endroits incultes et stériles (Dk.) 2. 6—8.
588. *Ajuga reptans* L. *Bugula reptans* Mill., croît dans les endroits humides et ombragés (Dk.) 2. 5—6.
589. *Betonica officinalis* L. les lieux incultes (Dk.) aux environs de *Westmeerbeeck* (Kx.) et au bois de *Cuytenhove* près de *Westerloo* (nob.) 2. 6—8.
590. *Lamium amplexicaule* L. *Pollichia amplexicaulis* Roth., croît dans les champs et les jardins potagers (Dk.) ①. 5—6.
591. *Lamium purpureum* L., croît dans les mêmes localités (Dk.) ①. 5—9.
592. *Lamium album* L., dans les endroits incultes et ombragés, près des habitations (Dk.) 2. 4—9.
593. *Galeopsis ladanum* L., croît dans les champs et endroits cultivés (Dk.) ①. 7—9.
594. *Galeopsis ochroleuca* Lam., se trouve dans les moissons (V. Bn.), surtout aux environs de *Zammel* (nob.) ①. 7—9.
595. *Galeopsis galeobdolon* L. *Galeobdolon luteum* Smith., dans les lieux couverts et humides aux environs de *Berchem* (Dk.) 2. 4—6.
596. *Galeopsis versicolor* Curt., dans les champs humides et les bois taillis aux environs de *Berchem* et *Wiltryck* (nob.) ①. 7—8.
597. *Galeopsis tetrahit* L., dans les moissons et les bords des champs aux environs de *Berchem* et dans la Campine (Dk.) ①. 7—9.
598. *Stachys annua* L. *S. nervosa* Gater., dans les champs aux environs de *Westerloo* (nob.) ①. 7—9.
599. *Stachys arvensis* L., commune dans les champs aux environs de *Mortsel* et *Contich* (V. Bn.) ①. 6—7.
600. *Stachys palustris* L., les bords des fossés dans les prés humides à *Deurne* (Dk.), et endroits marécageux entre *Herselt* et *Westerloo* (nob.) 2. 6—8.
601. *Stachys ambigua* Smith., dans les champs aux environs de *Berchem* et *Mortsel* (nob.) 2. 7—8.
602. *Stachys sylvatica* L., dans les lieux ombragés à *Berchem* (Dk.) et dans la forêt de *Tongerloo* (nob.)  $\beta$ . *hybrida* (Kx.), aux alentours de l'abbaye de *Everbode*. C'est probablement le produit du *S. germanica* qui aura été cultivé à *Everbode*, fécondé par le



*S. sylvatica*; car les feuilles ont la forme de celles du dernier et le duvet laineux du premier. On pourrait l'appeler *Stachys germanico-sylvatica*. Schiède, en signalant le *Stachys ambigua* comme hybride du même *S. sylvatica* avec le *S. palustris*, avait déjà constaté la tendance au croisement que présentent les espèces de ce genre. M. le professeur Kickx l'a nommé dans son herbier, *S. sylvatica*, *B. hybrida*.

603. *Ballota nigra* L. *B. vulgaris* Lk., les bords des chemins, dans les endroits incultes près des habitations, et surtout sur les remparts de la ville (Dk.) 24. 6—9.
604. *Marrubium vulgare* L., les bords des chemins et des champs (Dk.), le long de la chaussée de Malines près de Waelhem (Kx.) 24. 6—8.
605. *Scutellaria minor* L., les bords des fossés dans les lieux incultes et humides aux environs de Eyndhout, Oevel et Tongerlo (Kx.) 24. 7—9.
606. *Scutellaria galericulata* L. *Cassida galericulata* Scop., dans les bois peu couverts et humides (Dk.) aux environs de Tongerlo (nob.) 24. 6—9.
607. *Thymus serpyllum* L., dans les endroits secs et sablonneux, sur le glacis de la citadelle, et de la ville du côté de la lunette Herenthals (Dk.) 24. 7—9.
608. *Thymus angustifolius* Lej. non Schreb., dans les endroits arides et sablonneux dans la Campine (Kx.) 24. 6—9.
609. *Thymus acinos* L., dans les endroits incultes et pierreux (Dk.) Nous n'avons pas encore rencontré cette espèce dans notre province.
610. *Prunella vulgaris* L. *P. officinalis* Cr., commune dans les prés secs et les bords des chemins dans les endroits peu ombragés (Dk.) 24. 6—9.
611. *Origanum vulgare* L., sur les bastions dans l'intérieur de la citadelle (Dk.) et dans les lieux pierreux de Diest, Everbode et de Heist-opdenberg (nob.) 24. 7—9.
612. *Clinopodium vulgare* L., dans les endroits incultes et pierreux (Dk.), au pied d'un mur dans l'enclos de la citadelle après le bombardement d'Anvers (Kx.) 24. 6—8.

#### DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE.

613. *Orobanche major* L. Parasite sur le genêt à balai (Dk.) 24. 6—7.
614. *Orobanche vulgaris* Lam. *O. Caryophyllacea* Smith. Parasite sur différentes racines dans les bois (V. Bn.). Nous ne l'avons jamais rencontrée.
615. *Orobanche ramosa* L., ne croît que sur le chanvre (V. Bn.) ①. 8—10.
616. *Orobanche cærulea* Vill. (V. Bn.). ne croît pas dans la province, quoiqu'en dise M. Van Beneden.

617. *Euphrasia nemorosa* Pers. *E. officinalis* L., dans les lieux incultes et humides aux environs de Wilryck et dans la Campine (Dk.) ①. 6—9.
618. *Euphrasia odontites* L. *Odontites rubra* Pers., dans les moissons aux environs de Berchem, Deurne (Dk.) Westerloo et de Herenthout (nob.) ①. 6—8.
619. *Rhinanthus cristagalli* L. *Alectrophus glaber* All., les champs, les moissons et sur le glacis de la citadelle du côté de Kiel (Dk.) ①. 5—7.
620. *Melanpyrum sylvaticum* L. *M. alpestre* Pers., croît partout dans les bois secs et couverts à Brasschaet Wilryck et dans la Campine (Dk.) ①. 6—8.
621. *Limosella aquatica* L., dans les lieux inondés pendant l'hiver (Dk.) ①. 6—8.
622. *Digitalis purpurea* L., les bois couverts (Dk.), aux environs de Rillaer (Kx.). Cette plante est très-rare à l'état spontané dans la province ②. 6—8.
623. *Scrophularia vernalis* L., dans les bois et les haies (Dk.), très-rare ②. 4—5.
624. *Scrophularia nodosa* L., commune sur les bords des champs ombragés et les bords des fossés (Dk.) ②. 6—7.
625. *Scrophularia aquatica* L., les bords des fossés et des étangs aux environs de Berchem, Wilryck, et dans le poldre près de Eeckeren (Dk.) ②. 6—9.
626. *Anthirrhinum orontium* L. *Orontium arvense* Pers., les moissons entre Wilryck et Contich (Dk.), et entre Herselt et Aerschot (nob.) ①. 7—10.
627. *Linaria minor* Desf. *Antirrhinum minus* L. dans les champs sablonneux (Dk.) près de l'abbaye de Everbode (nob.) ①. 6—8.
628. *Linaria vulgaris* Mill. *Antirrhinum linaria* L., les bords des chemins et des champs et sur le glacis de la ville (Dk.) ②. 6—9.
629. *Linaria cymbalaria* Mill. *Antirrhinum cymbalaria* L., dans les fentes des vieux murs (Dk.) ②. 4—10.
630. *Kickxia elatine* Dmtr. Prodröm. *Antirrhinum elatine* L., les champs argileux entre Wilryck et Contich (Dk.) ①. 7—9.
631. *Kickxia spuria* Dmtr. Prodröm. *Antirrhinum spurium* L., sur la digue de l'Escaut (Dk.) près de Austruweel en 1822 (Kx.) ①. 7—9.
632. *Pedicularis palustris* L., dans les endroits humides et marécageux (Dk.) aux environs de Wilders près de Gheel (Kx.) et de Westerloo (nob.) ②. 5—7.
633. *Pedicularis sylvatica* L., dans les endroits incultes aux environs de Schooten, Brasschaet et dans la Campine (Dk.) ②. 4—6.

TETRADYNAMIE SILICULEUSE.

634. *Draba verna* L. *Eraphila verna* Decand., partout dans les champs et endroits sablonneux (Dk.) ①. 5—5.
635. *Draba muralis* L., dans les lieux secs (V Bn.) ①. 4—5.
636. *Myagrum sativum* L. *Camelina sativa* Medic., cultivée dans les environs de Malines (V. Bn.) à l'état spontané dans les champs entre Contich et Mortsel (nob.) ①. 5—7.
637. *Myagrum dentatum* L. *Camelina dentata* Pers., croît pêle-mêle avec le lin dans la Campine (nob.) ①. 5—7.
638. *Iberis nudicaulis* L. *Teesdalia nudicaulis* R. Br., les champs sablonneux et endroits incultes; assez commune partout (Dk.) ①. 4—5.
639. *Alyssum incanum* L., dans les endroits incultes aux environs de Malines (V. Bn.), les bords des champs à Stuyrenberg et sur le glacis de la ville hors la porte de Borgerhout (nob.) ②. 5—10.
640. *Alyssum maritimum* Lam. (V. Bn.). Il est douteux que cette plante se rencontre dans notre province; elle a été observée dans les Flandres par Van Hoorebeke.
641. *Cochlearia armoracia* L., cultivé dans les jardins (V. Bn.) à l'état spontané sur les glacis et bords des fossés de la ville, hors la porte St-Georges (nob.) ②. 5—7.
642. *Cochlearia officinalis* L., les bords de l'Escaut près d'Austruweel et dans le polder à la Tête de Flandre (Dk.) ②. 5—7.
643. *Cochlearia coronopus* L. *Senebiera coronopus* Poir., partout le long des chemins dans les polders et sur les digues de l'Escaut (V. Bn.) ①. 6—8.
644. *Lepidium latifolium* L., les bords des champs et les prés dans les polders (Dk.) aux environs de Beerendrecht (Kx.) ②. 6—7.
645. *Lepidium ruderales* L. *Thlaspi tenuifolium* Lam., fl. fr., dans les endroits incultes et les bords des chemins entre Schrick et Betecom (Kx.) ①. 6—8.
646. *Lepidium sativum* L. (V. Bn.), cultivé dans les jardins.
647. *Thlaspi bursapastoris* L. *Capsella bursapastoris* Moench., commune partout dans les endroits incultes près des habitations (Dk.) ①. 4—9.
648. *Thlaspi arvense* L., les champs aux environs de Eeckeren, Oorderen, Wilryck et Contich (Dk.) ①. 4—9.
649. *Thlaspi campestre* L. *Lepidium campestre* Ait., les champs argileux (V. Bn.), rare ①. 5—8.

TETRADYNAMIE SILIGUEUSE.

650. *Raphanus raphanistrum* L. R. *sylvestris* Lam., fl. fr., dans les champs sablonneux (Dk.) et sur la digue près de Austruweel en 1822 (Kx.) ①. 6—7.

631. *Raphanus sativus* L. (V. Bn.), cultivé :  
 632. *Erysimum officinale* L. *Sisymbrium officinale* Curt., les bords des chemins près des habitations (Dk.) ①. 5—10.  
 633. *Erysimum barbarea* L. *Barbarea vulgaris* Rchb., croît dans les champs entre *Vieux-Dieu* et *Bouchaut* (Dk.) ②. 5—8.  
 634. *Erysimum alliaria* L. croît dans les endroits couverts et humides aux environs de *Deurne*, et *Borsbeek* (Dk.) ②. 5—7.  
 635. *Erysimum cheiranthoides* L. f. *parriflorum*. Jacq., les champs dans le poldre près de *Austruweel* (V. Bn.) et aux environs de *Herselt* dans la Campine (nob.) ①. 6—9.  
 636. *Cheiranthus cheiri* L., sur les vieux murs des fortifications hors la porte de *Slyk* et à la citadelle (Dk.) ②. 5—6.  
 637. *Arabis thaliana* L. *Turritis thaliana* Desf., dans les champs sablonneux de *Contich*, *Wilryck* et *Tongerloo* (Dk.) ①. 4—9.  
 638. *Brassica oleracea* L. Cette espèce présente plusieurs variétés dont la plupart sont cultivées dans les jardins potagers (Dk.).  
 639. *Brassica napus* L. f. *asperifolia* Lam., cultivé (Dk.).  
 660. *Brassica campestris* L., cultivé (Dk.).  
 661. *Moricandia arvensis* Decand. *Brassica arvensis* L. Cette belle espèce croissait sur les décombres dans l'intérieur de l'abbaye de *Everbode*, très-rare (Kx.) elle n'y est plus aujourd'hui ②. 6.  
 662. *Turritis glabra* L. *Arabis perfoliata* Lam., croît aux alentours et dans l'intérieur de l'abbaye de *Everbode* (nob.) ②. 5—6.  
 663. *Turritis hirsuta* L. *Arabis hirsuta* Scop., dans les lieux secs et arides, et les vieux murs (Dk.) ②. 5—7.  
 664. *Bunias orientalis* L. *Rapistrum glandulosum* Berg., croît pêle-mêle avec l'*Euphorbia esula* sur le glacis de la lunette du *Kiel*, rare (nob.) ②. 5—7.  
 665. *Cardamine parriflora* L., dans les prés humides aux environs de *Westerloo* (Dk.) ①. 4—5.  
 666. *Cardamine hirsuta* L. f. *præcox* Poll., les bords des fossés dans les endroits humides (Dk.) ①. 4—5.  
 667. *Cardamine pratensis* L., commune partout dans les prés et endroits humides et ombragés (Dk.) β. *flore pleno* Clus., dans les prés entre *Kiel* et *Hoboken* (nob.) ②. 4—5.  
 668. *Cardamine amara* L. f. *nasturtiana* Thuill., les bords des fossés et des ruisseaux (Dk.) ②. 4—5.  
 669. *Sinapis alba* L., (V. Bn.) cultivée.  
 670. *Sinapis arvensis* L., les champs humides aux environs de *Berchem*, (Dk.) ①. 6—10.  
 671. *Sinapis nigra* L., croît sur les digues de l'Escaut et près des habitations à la *Tête de Flandre* (V. Bn.) et aux alentours du fort *Swyndrecht* (nob.) ①. 5—6.  
 672. *Sisymbrium sophia* L. f. *parriflorum* Lam., fl. fr., dans les champs et les moissons à *Stuyvenberg* (Dk.) et entre *Herselt* et *Aerschot* (nob.) ①. 6—8.  
 673. *Sisymbrium nasturtium* L., dans les eaux claires et stagnantes

- dans les prés aux environs de *Berchem*, *Kiel* et *Hoboken* (Dk.) 24. 5—8.
674. *Sisymbrium amphibium* L. *Nasturtium amphibium* Ait., dans les eaux stagnantes, assez commune (Dk.) 24. 6—8.
675. *Sisymbrium palustre* L. *Nasturtium palustre* Decand., les fossés dans la Campine (V. Bn.) ①. 6—9.
676. *Sisymbrium sylvestre* L. *S. vulgare* Pers., dans les fossés peu profonds, et les lieux souvent inondés par de grandes pluies (Dk.) 24. 6—9.
677. *Sisymbrium murale* L. (V. Bn.), ne croit pas dans notre province.
678. *Sisymbrium tenuifolium* L. *Diplotaxis tenuifolia* Decand., commune sur les remparts de la ville (Dk.) ②. 6—9.

MONADELPHIE PENTANDRIE.

679. *Erodium cicutaria* Willd. *Geranium cicutarium* L., croit partout dans les champs sablonneux (Dk.).

MONADELPHIE DÉCANDRIE.

680. *Geranium robertianum* L. *G. fœtidum* Moench., les endroits humides et ombragés (Dk.) ①. 5—10.
681. *Geranium columbinum* L., les champs frais aux environs du *Vieux-Dieu* et de *Wilryck* (Dk.) ①. 6—8.
682. *Geranium dissectum* L., sur la digue de l'Escaut près d'*Austruweel* (Dk.) ①. 5—8.
685. *Geranium rotundifolium* L. *G. subrotundum* Ehrh., dans les champs sablonneux et sur le glacis de la ville (Dk.) ①. 6—7.
684. *Geranium pusillum* L. *G. malvasolium* Scop., les gazons, le long des chemins entre *Kiel* et *Wilryck* (nob.) ①. 6—9.
685. *Geranium molle* L., dans les champs et les bords des chemins aux environs de *Berchem* (Dk.) ①. 4—9.
686. *Geranium pyrenaicum* L., dans les champs entre *Berchem* et *Deurne*, très-rare (nob.) 24. 5—7.
687. *Geranium sanguineum* L. (V. Bn.), n'est pas une plante spontanée de notre province.

MONADELPHIE POLYANDRIE.

688. *Malva alcea* L. (V. Bn.), cultivé dans les jardins d'agrément.
689. *Malva moschata* L., dans les endroits incultes aux environs de *Rillaer* près de *Aerschot* (Kx.) 24. 6—9.
690. *Malva sylvestris* L., commune partout près des habitations et les bords des chemins (Dk.) ②. 6—9.
691. *Malva rotundifolia* L. *M. parviflora* Huds., non L., les en-

droits sablonneux près des habitations à *Merxem* (Dk.) et à *Westerloo* (nob.) 2½. 6—10.

692. *Althaea officinalis* L., croit-pêle-mêle avec l'*Arundo phragmites* sur les bords de l'Escaut près du fort *St-Hilaire* (Dk.) et les endroits marécageux près de *Oorderen* (nob.) 2½. 7—8.

DIADELPHIE HEXANDRIE.

693. *Fulmaria parviflora* Lam., (V. Bn.) ne croit pas dans la province.  
 694. *Fumaria officinalis* L., commune dans les champs et les jardins potagers (Dk.) ①. 5—8.  
 695. *Fumaria capreolata* L., croit dans les champs cultivés (V. Bn.), aux environs de *Wilryck*, assez rare (nob.) ①. 6—7.  
 696. *Corydalis tuberosa* Decand. *Fumaria bulbosa* L., dans les bois ombragés et les buissons (Dk.) 2½. 4—5.  
 697. *Corydalis claviculata* Decand. *Fumaria claviculata* L., dans les endroits sablonneux et ombragés aux environs de *Norkhoven* et *Nodderwyk* dans la Campine (nob.) ①. 6—8.

DIADELPHIE OCTANDRIE.

698. *Polygala vulgaris* L., dans les bois incultes et humides aux environs de *Brasschaet* (Dk.) et dans la Campine 2½. 5—9.

DIADELPHIE DÉCANDRIE.

699. *Spartium scoparium* L. *Genista hirsuta* Moench., les bois secs et les endroits incultes, sablonneux, commun partout (Dk.) ½. 7—8.  
 700. *Genista anglica* L. *G. minor* Lam., fl. fr., dans les endroits stériles et humides aux environs des bruyères de *Brasschaet* et dans la Campine, (Dk.) ½. 5—6.  
 701. *Genista tinctoria* L. *Sparticum tinctorium* Roth., les endroits incultes aux environs de *Rillaer* (Kx.) *Rethy*, *Laerm*, près de *Gheel*, et entre *Herselt* et *Aerschot* (nob.) ½. 6—8.  
 702. *Genista pilosa* L. *G. repens* Lam., fl. fr., les endroits arides dans les environs de *Gymel* et *Goor*, près de *Herselt* (Kx.) et entre *Veerle* et *Everbode* (nob.) ½. 5—9.  
 703. *Ulex europæus* L., les endroits incultes et arides entre *Broecchem* et *Nylen* (V. Bn.), dans la bruyère de *Brasschaet* (Westend.) à *Brecht*, et à *Moolstede* près de *Everbode* (nob.) ½. 5—10.  
 704. *Ononis spinosa* L. *O. arvensis* Lam., les bords des champs et des chemins dans les polders, et la digue de l'Escaut surtout à *Kiel* (Dk.) 2½. 6—8.  
 705. *Phaseolus vulgaris* L. (V. Bn.), cultivée.

706. *Phaseolus nanus* L. (V. Bn.), cultivée.
707. *Orobis tuberosus* L., les endroits montagneux au bois de *Cuytenhoeve*, et les endroits incultes non loin des marécages de *Kaeistract* à *Westerloo* (nob.) 24. 5—6.
708. *Pisum arvense* L. (V. Bn.), cultivée.
709. *Pisum sativum* L. (V. Bn.), cultivée.
710. *Lathyrus aphaca* L. *L. segetum* Lam., fl. fr. (V. Bn.). N'appartient pas à notre province, à ce que nous croyons.
711. *Lathyrus nisfolia* L., dans les endroits ombragés (Dk.) entre *Sichem* et *Messelbroek* (Kx.) 24. 5—7.
712. *Lathyrus tuberosus* L., les moissons dans le poldre entre *Austruweel* et *Eeckeren* (V. Bn.) 24. 5—7.
713. *Lathyrus pratensis* L., les prés secs, les bords des champs, et sur le glacis de la ville (Dk.) 24. 6—8.
714. *Lathyrus sylvestris* L., dans les haies et les prés (V. Bn.) 24. 7—8.
715. *Lathyrus latifolius* L., dans les haies et les endroits ombragés (Dk.), nous ne l'avons pas trouvé jusqu'ici, 24. 6—9.
716. *Vicia faba* L. *Faba vulgaris* Moench., cultivé dans les jardins,  $\beta$ . *æquina* Pers., cultivé dans les poldres (nob.) 1. 6—8.
717. *Vicia dumetorum* L., croît dans les haies et bois ombragés (Dk.) 24. 6—8.
718. *Vicia cracea* L., dans les prés secs et sur le glacis de la ville (Dk.) 24. 7—8.
719. *Vicia tenuifolia* Roth. *V. gerardi* Willd. Prod., sur le glacis de la lunette du *Kiel*, rare (nob.) 24. 6. Le *V. onobrychoïdes* de M. Tinant, ch. des pl., n° 578, ne diffère par aucun caractère de notre espèce que nous venons de citer.
720. *Vicia sativa* L., croît partout dans les moissons (Dk.)  $\epsilon$ . *nemorialis* Pers., dans les champs aux environs de *Edeghem* et de *Luythaegen* (nob.) 1. 6—8.
721. *Vicia lathyroides* L., croît dans les lieux secs (Dk.) aux environs de *Everbode* (Kx.), assez rare 1. 5—9.
722. *Astragalus glycyphyllos* L., sur les bords des chemins, le long du canal de Bruxelles à *Willebroek* (Dk.) 24. 6—7.
723. *Trifolium arvense* L., croît dans les champs sablonneux à *Stuyvenberg* (Dk.) et à *Everbode* (nob.) 1. 7—9.
724. *Trifolium alpestre* L., dans les endroits montagneux aux environs de *Herselt* et de *Aerschot* (nob.) 24. 5—7.
725. *Trifolium pratense* L., dans les prés, et cultivés dans les champs (Dk.) 24. 5—7.
726. *Trifolium repens* L., dans les prés et bords des chemins, dans les champs (Dk.),  $\beta$  *phyllanthemum* Siv., sur les bords du chemin de fer, près de *Hove* (nob.) 24. 5—8.
727. *Trifolium subterraneum* L. (V. Bn.), ne croît pas dans la province d'Anvers.
728. *Trifolium procumbens* L., commun dans les pâturages (nob.) 1. 5—8.



729. *Trifolium fragiferum* L., sur les bords des chemins et les prés dans les polders (Dk.), et entre *Meetshoven* et *Aerschot* (Kx.) ①. 6—8.
730. *Trifolium agrarium* L., assez commun dans les prés secs et les champs sablonneux (Dk.) ①. 6—8.
731. *Trifolium campestre* Schreb., croît dans les champs (V. Bn.) ①. 7—9.
732. *Trifolium rubens* L., cultivé dans les champs aux environs de *Beverloo* (Westend) ②. 6—8.
733. *Trifolium filiforme* L., croît dans les prés aux environs de *Berchem* (Dk.) ①. 6—7.
734. *Melilotus officinalis* Hayne. *Trifolium melilotus* α. L., croît sur les bords de l'Escaut près de *Stocketsel*, et près d'*Austruweel* (Dk.) ②. 6—9.
735. *Melilotus alba* Thuill. *M. leucantha* Koch. *Trifolium melilotus*, γ. L., les bords des champs sablonneux près de la lunette du *Kiel*, et sur le glacis entre la porte *St. George* et celle de *Borgerhout* (nob.) ②. 6—9.
736. *Coronilla varia* L., croît dans les environs de *Malines*. La connaissance de cette espèce est due à M. Stoffels, pharmacien à Malines, ainsi que la plupart des plantes spontanées citées dans la flore de MM. Van Beneden et Teurlinckx.
737. *Ornithopus perpusillus* L., croît partout sur les bords des chemins dans les endroits sablonneux (V. Bn.) ①. 5—8.
738. *Medicago lupulina* L., dans les champs aux environs de *Berchem*, *Deurne* et *Wilryck* (Dk.) ①. 6—9.
739. *Medicago Willdenowi* Merat., *M. lupulina* Willd., non L., dans les prés aux environs de *Beverloo* (Westend.) ①. 6—9.
740. *Medicago falcata* L., les prés secs et les bords des champs à *Stuyvenberg*, β. *cærulea* Dmtr., sur le glacis hors la porte rouge (nob.) ②. 6—8.
741. *Medicago sativa* L., cultivée, et à l'état spontané sur les glacis de la ville et de la citadelle (V. Bn.) ②. 6—8.
742. *Medicago apiculata* Willd., sur la digue de l'Escaut et les bords des champs près d'*Austruweel* ①. 5—7.
743. *Medicago maculata* Willd. *M. arabica* L., dans les champs cultivés aux environs de *Merxem* (Dk.) ①. 5—7.
744. *Medicago minima* Willd., sur la digue de l'Escaut près du fort *Philippe* (V. Bn.) ①. 5—6.
745. *Robinia pseudoacacia* L., cultivée dans les bois particuliers et à l'état spontané dans les bois aux environs de *Schooten* (nob.) ②. 6.
746. *Ervum hirsutum* L., croît partout dans les moissons (Dk.) ①. 6—7.
747. *Ervum tetraspermum* L., dans les champs humides aux environs de *Berchem* (Dk.). β. *gracile* Dmtr. *Vicia gracilis* Lois. Desl., croît dans les moissons entre *Wilryck* et *Contich* (nob.) ①. 5—7.

748. *Lotus corniculatus* L., les prés secs et les bords des chemins dans les endroits sablonneux (Dk.) 21. 5—8.

POLYADELPHIE POLYANDRIE.

749. *Hypericum quadrangulum* L. non Poll., les bords des fossés dans les endroits humides, près d'*Austruweel*, et dans les prés entre *Berchem* et *Borgerhout* (Dk.) 21. 7—8.  
 750. *Hypericum dubium* Leers., II. *obtusum* Moench., les bords des champs et endroits ombragés près de *Exterlaer* (nob.) 21. 7—8.  
 751. *Hypericum perforatum* L., croît partout sur les bords des champs sablonneux (Dk.) 21. 6—9.  
 752. *Hypericum hirsutum* L. II. *vilosum* Cr., croît dans les bois ombragés (Dk.) 21. 6—8.  
 753. *Hypericum montanum* L., croît dans les lieux montueux au bois de *Everbode* (nob.) 21. 7—9.  
 754. *Hypericum pulchrum* L., commune dans les bois peu ombragés de la Campine (Dk.) 21. 7—9.  
 755. *Hypericum humifusum* L., les champs sablonneux humides, et les endroits incultes, aux environs de *Mortsel*, *Wilryck* et partout dans la Campine (Dk.) 21. 6—9.  
 756. *Hypericum clodes* L., dans les mares (Dk.) des environs de *Tongerloo* (nob.) et entre *Wechter* et *Tremeloo* (Kx.) 21. 7—9.

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE ÉGALE.

757. *Cichorium endivia* L., cultivée (V. Bn.).  
 758. *Cichorium intybus* L., croît à l'état spontané à *Stuyvenberg* et sur le glacis de la citadelle; on la cultive dans les jardins (Dk.) 21. 6—9.  
 759. *Hypochaeris radicata* L., croît dans les allées des bois et les prés secs (Dk.) 21. 6—8.  
 760. *Hypochaeris glabra* L., dans les champs sablonneux aux environs de *Schooten* et dans la Campine (V. Bn.) ①. 6—8.  
 761. *Tragopogon parvifolius* L. T. *sativus* Galer., sur les digues de l'Escaut près du fort *St-Hilaire* et de *Philippe* (Dk.) ②. 6—8.  
 762. *Tragopogon pratensis* L., commun dans les prés secs et sur le glacis de la ville. β. *undulatum* Merat. T. *undulatum* Thuil. Dekin?, dans les mêmes localités (Dk.) ②. 5—7.  
 763. *Picris hieracioides* L. *Crepis hieracioides* Lam., fl. fr., les bords des champs ombragés aux environs de *Berchem* (Dk.) 21. 7—8.  
 764. *Helmenthia echioides* Gaertn. *Picris echioides* L., sur la digue de l'Escaut près du fort *Marie*, rare (nob.) ①. 6—7.  
 765. *Leontodon hirtum* L. *Thrincia hirta* Roth., assez commune sur le glacis hors la porte rouge (V. Bn.) 21. 6—9.  
 766. *Leontodon hispidum* L. *Thrincia hispida* Roth., croît sur les bords des champs (Dk.) à *Tongerloo* (nob.) 21. 6—9.

767. *Leontodon autumnale* L., le long des chemins dans les champs (Dk.) 2. 7—10.
768. *Crepis biennis* L., dans les prés aux environs de *Berchem* (Dk.)  $\beta$ . *lacera* Koch., sur la digue de l'Escaut *Kattendyk* (nob.) 2. 5—8.
769. *Crepis dioscorides* L., sur les bords des champs et des chemins (Dk.) 1. 7—8.
770. *Crepis tectorum* L., les bords des champs aux environs de *Berchem* et *Wilryck* (Dk.) 1. 6—9.
771. *Crepis virens* L., croît dans les prés secs (Dk.) 1. 6—9.
772. *Barkhausia hispida* Rchb. *Crepis hispida* W. et K., dans les prés secs aux environs de *Berchem*, très-rare (nob.) 1. 6—9.
773. *Prenanthes muralis* L., croît dans les endroits ombragés (Dk.) au bois de *Tongerloo* (nob.) 1. 6—8.
774. *Lactuca sativa* L., cultivé dans les jardins potagers (nob.) 1. 7-8.
775. *Lactuca scariola* L. *L. sylvestris* Lam., les bords des chemins et des champs dans le poldre entre le fort *Philippe* et *Oorderen*, rare (nob.) 2. 7—9.
776. *Hieracium pilosella* L., dans les lieux sablonneux incultes (Dk.) 2. 5—7.
777. *Hieracium auricula* L. non fl., dan., les lieux sablonneux, humides, aux environs de *Tongerloo*, *Westmeerbeeck* et *Boisschot* (nob.) 2. 5—6.
778. *Hieracium murorum* L., commune partout dans les bois ombragés (Dk.) 2. 5—8.
779. *Hieracium paludosum* L., dans les bois couverts, humides (Dk.) 2. 6—8.
780. *Hieracium sylvestre* Tausch., croît sur le glacis de la lunette du *Kiel* (nob.) 2. 6—8.
781. *Hieracium sabaudum* L., dans les bois secs aux environs de *Brasschaet* et dans la Campine (Dk.) 2. 8—9.
782. *Hieracium umbellatum* L., croît partout dans les bois secs ombragés (Dk.) 2. 7—9.
783. *Sonchus palustris* L. *S. sagittatus* Moench., endroits humides dans les poldres et les bords de l'Escaut, pêle-mêle avec l'*Arun-do phragmites* (Dk.) 2. 7—8.
784. *Sonchus arvensis* L., dans les champs cultivés aux environs de *Wilryck*, *Contich*, dans les poldres et à *Tongerloo* dans la Campine (Dk.) 2. 6—8.
785. *Sonchus oleraceus* L., dans les jardins et les champs (Dk.)  $\alpha$ . *integrifolius* Dmtr., entre *Edegheem* et *Contich*;  $\beta$ . *triangularis* Dmtr., commune dans les jardins;  $\gamma$ . *laciniatus* Dmtr., sur l'esplanade près de la porte de la citadelle (nob.) 1. 6—10.
786. *Sonchus fallax* Wallr., dans les jardins et les champs.  $\beta$ . *asper* Dmtr., sur la digue de l'Escaut près du fort *du nord* (nob.) 1. 7—9.
787. *Lapsana communis* L., partout dans les lieux ombragés près des habitations (Dk.) 1. 6—7.

788. *Lapsana gracilis* Lam., fl. fr. *Hyoseris minima* L., commune dans les champs (V. Bn.) surtout du côté de *Herenthals* (Kx.) ①. 6—7.
789. *Carlina vulgaris* L., dans les endroits montueux et stériles aux environs de *Veerte*, le bois de *Cuytenhove*, *Herselt* et *Aerschot* (Dk.) ②. 7—8.
790. *Cnicus oleraceus* L. *Cirsium oleraceum* All., dans les prés humides entre *Duffel* et *Waelhem* (Dk.) ④. 7—8.
791. *Lampa tomentosa* Lam. *Arctium tomentosum* Pers., sur la digue de l'Escaut près du fort *St-Hilaire* (nob.) ④. 7—8.
792. *Lappa minor* Decand. *Arctium minus* Pers., dans les endroits incultes près des habitations (V. Bn.) à *Everbode* (Kx.) et à la *Tête de Flandre* (nob.) ④. 7—8.
793. *Lappa major* Gaertn. *Arctium majus* Thuill., dans les endroits incultes près des habitations (Dk.) ②. 7—8.
794. *Carduus tenuiflorus* Smith., croît dans les champs sablonneux (V. Bn.), nous ne l'avons jamais rencontrée.
795. *Carduus crispus* L. non Huds., croît le long des chemins et des haies près des habitations (Dk.) ②. 6—8.
796. *Carduus nutans* L. Dek., nous doutons que cette plante se trouve dans la province.
797. *Cirsium lanceolatum* Scop. *Carduus lanceolatus* L., le long des chemins dans les lieux cultivés (Dk.) ②. 6—9.
798. *Cirsium acaule* All. *Carduus acaulis* L. (Dk.), dans les endroits humides et buissonneux entre *Het huys tenhalve* et *Boom* (Kx.) ④. 6—8.
799. *Cirsium palustre* Scop. *Carduus palustris* L., dans les endroits incultes et humides (Dk.) ②. 7—8.
800. *Onopordon acanthium* L., les endroits incultes près de *Stocket-sel*, dans l'intérieur de la citadelle et à *Stuyvenberg* (Dk.) ②. 6—7.
801. *Serratula arvensis* L. *Cirsium arvense* Scop., les bords des chemins et des champs, et les moissons entre *Edeghem* et *Contich* (Dk.) ④. 6—8.
802. *Serratula tinctoria* L., *Carduus tinctorius* Scop., dans les bois aux environs de *Brasschaet* (V. Bn.), au bois de *Cuytenhoere* près de *Westerloo* (nob.) et entre *Gymel* et de *Goor* (Kx.) ④. 6—9.
803. *Chrysocoma linsyris* L., sur les colines sablonneuses aux environs de *Beverloo* et *Eppen* (Westend.) ④. 8—9.
804. *Eupatorium cannabinum* L., dans les bois humides et le long des fossés des prés entre *Berchem* et *Borgerhout* (Dk.) ④. 7—8.
805. *Bidens tripartita* L., dans les fossés et bords des eaux stagnantes aux environs de *Berchem* (Dk.) ①. 7—9.
806. *Bidens cernua* L., dans les mêmes localités (Dk.). *γ. coreopsidis* Dmtr. *Coreopsis bidens* L., dans les endroits marécageux entre la *Tête de Flandre* et *Swyndrecht* et à *Nodderwyk* dans la Campine (nob.) ①. 8—9.

SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE SUPERFLUE.

807. *Artemisia absinthium* L., cultivée dans les jardins (Dk.), 3-9.
808. *Artemisia campestris* L., dans les endroits sablonneux de la Campine, assez rare (Dk.) 24. 8-9.
809. *Artemisia dracunculus* L., cultivée dans les jardins potagers (V. Bn.) 24. 7-8.
810. *Artemisia maritima* L., sur les bords de l'Escaut près du fort Philippe et de Lillo (Dk.) 24. 8-10.
811. *Artemisia vulgaris* L., croit partout sur les bords des chemins et des champs (Dk.) 24. 7-8.
812. *Tanacetum vulgare* L., les bords des champs sablonneux et sur le glacis de la ville, assez commun (Dk.) 24. 7-8.
813. *Conyza squarrosa* L., dans les endroits incultes (Dk.), sur les décombres d'un vieux fort, situé sur la digue de l'Escaut en 1822 (Kx.) 24. 7-9.
814. *Gnaphalium luteo-album* L., les champs sablonneux et humides entre Herselt et Aerschot (Dk.) ①. 7-8.
815. *Gnaphalium sylvaticum* L., dans les bois humides ombragés et lieux incultes (Dk.) 24. 8-9.
816. *Gnaphalium uliginosum* L., commune dans les champs humides de le Campine (Dk.) ①. 7-8.
817. *Gnaphalium dioicum* L. *Antennaria dioica* Moench., dans les endroits secs et arides des bruyères de la Campine et près de Brasschaet (Dk.) 24. 5-8.
818. *Filago arvensis* L., croit partout dans les champs sablonneux (Dk.) ①. 7-8.
819. *Filago montana* L., les collines sablonneuses dans la Campine (Dk.) ①. 7-9.
820. *Filago germanica* L. *F. vulgaris* Lam., fl. fr., sur les bords des champs près de l'abbaye de Everbode (Dk.) ①. 8-9.
821. *Bellis perennis* L., partout dans les prés peu humides (Dk.) 24. 5-11.
822. *Matricaria chamomilla* L., dans les moissons et les terrains nouvellement remués (Dk.) ①. 6-8.
823. *Matricaria suaveolens* L., croit dans les champs et les moissons (Dk.) ①. 7-8.
824. *Matricaria parthenium* L., croit à l'état spontané dans les jardins potagers dans la Campine (Dk.) 24. 7-9.
825. *Chrysanthemum leucanthemum* L., commune dans les prés secs (Dk.) β. *sylvestre* Pers., dans les champs frais aux environs de Schooten (nob.) 24. 5-9.
826. *Chrysanthemum segetum* L., dans les moissons aux environs de Contich, et partout dans la Campine (Dk.) ①. 6-9.
827. *Pyrethrum inodorum* Moench. *Chrysanthemum inodorum* L., commune dans les lieux cultivés (Dk.) ①. 7-9.

828. *Pyrethrum maritimum* Smith. *Matricaria maritima* L., sur les bords de l'Escaut, près du chantier de *Kattendyk* et à la *Tête de Flandre* (nob.) ①. 7—9.
829. *Inula pulicaria* L. *Pulicaria vulgaris* Gærtn., croît le long des chemins inondés dans les saisons pluvieuses aux environs de *Tongerloo* et de *Zoerpawys*, dans la Campine (Dk.) ①. 8—9.
830. *Inula dysenterica* L. *Pulicaria dysenterica* Cass., les bords des chemins et des fossés dans les lieux humides, incultes, aux environs de *Merxem* et *Borgerhout* (Dk.) ②. 7—8.
831. *Inula salicina* L., croît dans les prés humides (V. Bn.).
832. *Eregiron canadense* L., croît partout dans les champs sablonneux et les bords des chemins (Dk.) ①. 7—10.
833. *Erigeron acris* L. *Trimorphæa acris* Cass., croît sur le glacis de la ville hors la porte de *St. George* et celle de *Borgerhout* ②. 7—9.
834. *Solidago virga aurea* L., dans les bois secs et endroits sablonneux, incultes aux environs de *Wilryck*, et partout dans la Campine (Dk.) ②. 7—9.
835. *Cineraria palustris* L., dans les endroits marécageux (Dk.) à *Wilders* près de *Gheel* (Kx.) ②. 6—7.
836. *Cineraria campestris* Retz. (V. Bn.). Il n'est pas probable que cette espèce croisse dans la province.
837. *Cineraria integrifolia* Jacq. *C. alpina* Hop., dans les bois (Dk.) aux environs de *Boom* (Kx.), rare ②. 5—7.
838. *Senecio vulgaris* L., croît partout dans les champs et les jardins (Dk.) ①. 5—11.
839. *Senecio sylvaticus* L., les bords des champs ombragés, dans les lieux sablonneux aux environs du *Vieux-Dieu* et partout dans la Campine (Dk.) ①. 6—8.
840. *Senecio jacobæa* L. *Jacobæa vulgaris* Gærtn., dans les prés secs, sur le glacis de la ville et les bords des chemins dans les endroits sablonneux (Dk.) ②. 7—8.
841. *Senecio aquaticus* Smith., dans les prés humides aux environs de *Austruweel* (Dk.) ②. 6—8.
842. *Senecio paludosus* L., croît dans les lieux marécageux (Dk.) ②. 6—8.
843. *Senecio sarracenicus* L., dans les bois ombragés, humides (Dk.) ②. 7—8.
844. *Senecio nemorensis* L. *S. nemophilus* Dmtr., Prodrum. Cette plante est très-commune dans les bois couverts, humides, aux environs de *Tongerloo* (nob.) ②. 7—8.
845. *Tussilago petasites* L. *Petasites vulgaris* Desf., sur la digue de l'Escaut et les bords des fossés entre *Kiel* et *Hoboken* (Dk.) et sur les décombres dans l'intérieur de l'abbaye de *Tongerloo* (Dk.) ②. 5—5.
846. *Tussilago farfara* L., sur le glacis hors la porte rouge et la digue de l'Escaut près de *Austruweel* (Dk.) ②. 5—4.
847. *Aster tripolium* L., les bords de l'Escaut et des étangs dans les

poldres (Dk.)  $\beta$ . ? *Tripolium luteum* Lobel. Hist. près du fort Marie (nob.) 24. 8—10.

848. *Anthemis arvensis* L., dans les champs aux environs de *Deurne*, *Hove* et *Contich* (Dk.) ①. 6—8.
849. *Anthemis mixta* L. Cette espèce nous a été communiquée par M. Verbert, observée par lui dans les endroits sablonneux et humides entre *Viersel* et *Grobbendonck* très-rare ①. 6—7.
850. *Anthemis cotula* L. A. *fœtida* Lam., fl. fr., dans les champs argileux et les moissons, assez commune (Dk.) ①. 6—8.
851. *Achillea ptarmica* L., dans les prés et les bords des ruisseaux aux environs de *Wilryck*, *Herenthout* et *Westerloo* (Dk.) 24. 7—9.
852. *Achillea millefolium* L., croît partout dans les prés secs et les bords des chemins (Dk.) 24. 6—8

#### SYNGENSIE POLYGAMIE FRUSTRANÉE.

853. *Centaurea cyanus* L., croît partout dans les moissons (Dk.) ①. 6—8.
854. *Centaurea scabiosa* L., dans les prés secs et endroits incultes (Dk.) et les bords des fossés de la ville hors la porte rouge en 1822 (Kx.).
855. *Centaurea jacea* L., les endroits montueux entre *Herselt* et *Westerloo* (Dk.) 24. 8—9.
856. *Centaurea nigra* L., croît partout dans les prés secs (Dk.) 24. 7—8.
857. *Centaurea calcitrapa* L., croissait anciennement sur les bords du Ruppel à *Rumpot*, *Boom*, etc. (Dk.); il n'y est plus aujourd'hui (Kx.)

#### GYNANDRIE DIANDRIE.

858. *Orchis militaris* L., croît dans les bois élevés, très-rare (Dk.) 24. 5—6.
859. *Orchis mascula* L., les endroits ombragés aux environs de *Brasschaet* (Dk.) 24. 4—6.
860. *Orchis morio* L., dans les prés secs (Dk.) aux environs de *Malines*, mais très-rare (Kx.)
861. *Orchis latifolia* L., commune dans les prés aux environs de *Borghout* et *Deurne* (Dk.) 24. 5—7.
862. *Orchis maialis* Rich., les prés secs et endroits stériles entre *Schooten* et *Brasschaet* (nob.) 24. 5—6.
863. *Orchis maculata* L. les prés stériles et aux alentours des bois à *Brasschaet* (V. Bn.)  $\beta$ . *albida* dans la Campine (nob.) 24. 6—8.
864. *Orchis bifolia* L. *Platanthera bifolia* Rich., dans les lieux stériles où l'eau a séjourné pendant l'hiver dans la Campine, et dans

- les bois humides peu couverts près de *Brasschaet* (Dk.) 24. 5—7.
865. *Satyrion viride* L. *Chamorchis viridis* Dmtr., Prodrum., croît dans les prés humides (Dk.) 24. 6—7.
866. *Ophrys myodes* Jacq. *Orchis muscaria* Scop., dans les bois secs, ombragés (V. Bn.) 24. 5—6.
867. *Ophrys nidus avis* L. *Epipactis nidus avis* Swartz, croît dans les bois ombragés (Dk.) 24. 5—6.
868. *Ophrys bifolia* Lam., fl. fr. *Epipactis ovata* Pers., dans les bois ombragés et humides aux environs de *Deurne*, *Wilryck* et dans la *Campine* (Dk.) 24. 5—7.
869. *Serapias latifolia* L. *Epipactis latifolia* Swartz, dans les bois humides et les bords des fossés ombragés aux environs de *Schooten* (Dk.) 24. 6—7.
870. *Serapias longifolia* L. *Epipactis palustris* Willd., dans les endroits humides et spongieux, aux environs de *Brasschaet* (Dk.) 24. 6—7.

#### GYNANDRIE HEXAGYNIE.

871. *Aristolochia clematites* L., dans les lieux incultes, ombragés (Dk.) aux environs de *Rillaer* (Kx.) et dans l'intérieur de l'abbaye de *Tongerloo* (nob.) 24. 6—8.

#### GYNANDRIE POLYANDRIE.

872. *Calla palustris* L., dans les endroits marécageux (Dk.) à *Willebroek* (Kx.), *Westerloo*, *Oosterloo* et *Wilders*, près de *Gheel* (nob.) 24. 6—8.
875. *Arum maculatum* L. *A. vulgare* Lam., dans les endroits ombragés, humides, aux environs de *Deurne* (Dk.), et aux alentours de l'abbaye de *Everbode* (nob.) 24. 5—6.

#### MONOËCIE MONANDRIE.

874. *Zannichellia palustre* L., dans les fossés et les eaux stagnantes (Dk.) ①. 7.
875. *Zannichellia pedunculata* Reichb., dans les eaux claires et stagnantes à *Austruweel*, et dans le poldre à la *Tête de Flandre* (nob.) ①. 7—8.
876. *Najas minor* Roth. *Caulinia fragilis* Willd., observée dans le canal de Louvain à Malines par M. Scheidweiler, croît aussi du côté de *Nieuport* (Kx.) ①. 7—8.
877. *Chara vulgaris* L., dans les eaux stagnantes (Dk.) ①. ? 6—10.
878. *Chara hispida* L. *C. tomentosa* Willd., dans les fossés de la ville, hors la porte rouge (Dk.) ①. ? 6—10.



879. *Chara gracilis* Smith. *C. flexilis* L., les eaux stagnantes dans les prés aux environs de *Schooten* ①? 6—8.  
 880. *Chara aspera* Rehb., dans les marécages près de *Westerloo* (nob.) et aux environs de *Gymel* près de *Herselt* (Kx.) ①? 6—7.  
 881. *Chara pulchella* Walr. *C. fragilis* Desv., dans les eaux stagnantes entre *Merxem* et *Austriuweel* ①? 5—7.  
 882. *Chara Brunii* Gmel., dans les marécages aux environs de *Tongerloo* (nob.) et de *Wechter* et *Tremeloo* (Kx.), très-rare ①? 6—8.

MONOÉCIE DIANDRIE.

883. *Lemna trisulca* L., dans les eaux stagnantes (Dk.), ①. 6—7.  
 884. *Lemna polyrrhiza* L., dans les fossés et les eaux stagnantes (V Bn.) ①. 6—7.  
 885. *Lemna gibba* L., les eaux stagnantes à *Merxem* et *Deurne* (nob.) ①. 6—7.  
 886. *Lemna minor* L., croît dans les mêmes localités ①. 6—7.

MONOÉCIE TRIANDRIE.

887. *Carex dioica* L. *C. laevis* Hoppe, croît dans les prés marécageux (Dk.) 24. 4—6.  
 888. *Carex pulicaris* L., croît sur les bords des fossés, dans les prés humides (Dk.) 24. 5—6.  
 889. *Carex arenaria* L. non *Leers.*, dans les endroits stériles et sablonneux aux environs de *Merxem*, *Brasschaet*, et dans la Campine (Dk.) 24. 4—5.  
 890. *Carex disticha* Schreb., les bords des champs ombragés, entre *Berchem* et *Wilryck* (nob.) 24. 6—7.  
 891. *Carex ovalis* Good. *C. nuda* Lam., fl. fr., sur les bords des fossés du fort du Nord, et dans les prés humides entre *Berchem* et *Borgerhout* (Dk.) 24. 4—5.  
 892. *Carex curta* Good. *C. tenella* Ehrh., les endroits humides et les bords des fossés dans la forêt de *Tongerloo* (nob.) 24. 5—6.  
 895. *Carex brizoides* L., dans les bois humides, ombragés (V. Bn.) 24. 4—5.  
 894. *Carex stellulata* Good. *C. muricata* Dek. Stat., *C. leersii* Will., Prodr., dans les prés incultes (Dk.), et les endroits inondés pendant l'hiver aux environs de *Beverloo* (Westend.) 24. 4—5.  
 893. *Carex vulpina* L. *C. spicata* Thuill., les bords des fossés dans les prés humides (Dk.), aux environs du *Kiel* (nob.) 24. 5—6.  
 896. *Carex divulsa* Good. *C. canescens* Huds., les endroits humides dans la bruyère entre *Tongerloo* et *Gheel* (nob.) 24. 4—5.  
 897. *Carex remota* L., dans les endroits ombragés et humides (Dk.) aux environs de *Westerloo* (nob.) 24. 5—6.

898. *Carex paniculata* L. non Ehrh., dans les pâturages humides et marécageux aux environs de *Beverloo* (Westend.).
899. *Carex caespitosa* L., dans les endroits humides (Dk.) entre *Tongerloo* et *Herenthals* (Kx.) 2l. 5—6.
900. *Carex stricta* Good. *C. melanochloris* Thuill., les bords des fossés marécageux aux environs de *Deurne* et *Borgerhout* (nob.) 2l. 4—5.
901. *Carex acuta* Smith, croît sur les bords des eaux stagnantes entre *Kiel* et *Hoboken* (Dk.) 2l. 4—5.
902. *Carex glauca* Scop. *C. recurva* Good., sur les bords des champs dans le poldre, près du fort du *Nord* (nob.) 2l. 4—6.
903. *Carex panicea* L., croît dans les lieux inondés pendant l'hiver à *Stalle* près de *Beverloo* (Westend.) 2l. 4—5.
904. *Carex pallescens* L., les endroits humides entre *Tongerloo* et *Gheel* (nob.) 2l. 4—6.
905. *Carex pilulifera* L. *C. decumbens* Ehrh., dans les lieux secs et incultes entre *Berchem* et *Wilryck*, rare (nob.) 2l. 5—6.
906. *Carex umbrosa* Host., les bords des chemins, dans les endroits sablonneux, ombragés entre *Merxem* et *Schooten* et à *Wilryck* (nob.) 2l. 5—6.
907. *Carex montana* L., croît dans les bois couverts (Dk.) 2l. 4—5.
908. *Carex ericetorum* Poll. *C. ciliata* Schkr., aux pieds des collines sablonneuses dans la bruyère près de *Beverloo* (Westend.) 2l. 4—5.
909. *Carex flara* L., les endroits spongieux dans la forêt de *Tongerloo* (nob.) 2l. 5—6.
910. *Carex aederi* Roth., les endroits humides dans la bruyère entre *Gheel* et *Eyndhout* (Kx.) 2l. 5—6.
911. *Carex drymeja* L., fil., dans les endroits humides et ombragés dans la Campine (Kx.) 2l. 5—6.
912. *Carex pseudo-cyperus* L., commune sur les bords des fossés, dans les prés humides (Dk.) 2l. 4—5.
913. *Carex vesicaria* L., dans les prés spongieux, ombragés, (Dk.) 2l. 4—5.
914. *Carex præcox* Jacq., dans les lieux incultes et arides aux environs de *Tongerloo* (nob.) 2l. 5—4.
915. *Carex ampullacea* Good., dans les marais du côté de *Lommel* (Westend.) 2l. 4—5.
916. *Carex ornithopoda* Willd. *C. digitata*;  $\beta$ . *Whibg.*, dans les endroits inondés pendant l'hiver aux environs de *Beverloo* (Westend.) 2l. 4—5.
917. *Carex riparia* Good. *C. crassa* Ehrh., les bords des eaux stagnantes aux environs de *Deurne*, *Borgerhout*, *Berchem* et *Hoboken* (nob.) 2l. 4—5.
918. *Carex paludosa* Good., dans les prés spongieux entre *Kiel* et *Hoboken* (nob.) 2l. 5—6.
919. *Carex hirta* Dec., *C. hirsuta* Dek. Stat. Dep.? dans les lieux sablonneux et ombragés entre *Berchem* et *Exterlaer*. *C. hirti-*

- formis* Dmtr. C. H. *β. glabra* Lej. et Court. Comp. Mich. et Lej. *agrost.*, n° 245, croît sur les bords des fossés de la lunette du *Kiel* (nob.) 2. 4—6.
920. *Carex capitata* L. (Dk.); nous n'avons jamais rencontré cette espèce dans la province d'Anvers.
921. *Carex filiformis* L. C. *splendida* Willd. Prodr., dans les endroits marécageux, aux environs de *Lommel* (Westend.) 2. 4—5.
922. *Sparganium natans* L., dans les marécages (V. Bn.) entre *Herselt* et *Westerloo* (nob.) 2. 6.
923. *Sparganium simplex* Smith. S. *erectum*. *β. L.*, dans les fossés marécageux et le canal de *Herenthals* entre *Berchem* et *Borgerhout* (nob.) 2. 6—8.
924. *Sparganium ramosum* Smith. S. *erectum* *α. L.*, croît sur les bords des fossés et des étangs à *Kattendyk* et à *Borgerhout* (Dk.) 2. 6—8.
925. *Typha latifolia* L., croît dans les marécages de *Westerloo* et de *Gheel* (Dk.) 2. 6—7.
926. *Typha angustifolia* L., se trouve dans les marécages entre *Kiel* et *Hoboken*, et dans les étangs à *Kattendyk* (Dk.) 2. 6—7.

#### MONOËCIE TÉTRANDRIE.

927. *Urtica urens* L., croît partout près des habitations et les jardins potagers (Dk.) ①. 6—11.
928. *Urtica dioica* L., croît dans les lieux incultes près des habitations (Dk.) 2. 7—9.
929. *Betula pubescens* Ehrh., croît dans les bois taillis de la Campine, surtout dans la forêt de *Tongerloo* (nob.) 2. 4—5.
930. *Betula alba* L., croît partout dans les bois de la Campine (Dk.) 2. 4—5.
931. *Alnus glutinosa* Gaertn. *Betula alnus* L., dans les bois humides et les bords des fossés (Dk.) 2. 1—5.
932. *Littorella lacustris* L., les mares dans la bruyère entre *Gheel* et *Herenthals* (Kx.), et aux environs de *Westerloo* (nob.) 2. 5—7.

#### MONOËCIE PENTANDRIE.

933. *Xanthium strumarium* L., croît dans les endroits incultes (V. Bn.) ①. 7—8.
934. *Amaranthus blitum* L., dans les lieux incultes près des habitations (Dk.) ①. 8—9.
935. *Amaranthus retroflexus* L., dans les endroits incultes (V. Bn.) ①. 7—9.

MONOËCIE POLYANDRIE.

956. *Sagittaria sagittifolia* L., croît dans les fossés et les ruisseaux (Dk.): *β. minor* Lobel., se trouve dans les étangs près de l'abbaye de *Everbode* (nob.) 2l. 6—7.
957. *Myriophyllum verticillatum* L., croît dans les eaux stagnantes (Dk.) aux environs de *Westerloo* (nob.) 2l. 7—8.
958. *Myriophyllum spicatum* L., dans les fossés et les eaux marécageuses dans la Campine (Dk.) 2l. 6—8.
959. *Ceratophyllum demersum* L. *C. tricorne* Dmtr. Prodrom., dans les fossés et les eaux stagnantes (Dk.), hors la porte rouge (nob.) et à *Tongerloo* dans la Campine (Kx.), 2l. 7—9.
960. *Ceratophyllum submersum* L. *C. inerme* Dmtr. Prodrom., croît dans les eaux claires et stagnantes (Dk.), dans la Campine (Kx.) et entre *Kiel* et *Hoboken* (nob.) 2l. 7—9.
961. *Ceratophyllum apiculatum* Rehb. *C. unicolorne* Dmtr. Prodr.? croît dans les eaux claires et stagnantes de la Campine, du côté de *Herenthals* (Kx.) 2l. 7—9.
962. *Poterium sanguisorba* L., croît dans l'intérieur de la citadelle, du côté de *Stocketzel* (Dk.) 2l. 7—8.
963. *Quercus robur* L., croît dans les bois (Dk.) H. 4—5.
964. *Quercus pendunculata* Willd., cultivé dans le bois de la Campine (V. Bn.) H. 4—5.
965. *Quercus pubescens* Willd. *Q. lanuginosa* Thuil., cultivé (V. Bn.) H. 4—5.
966. *Carpinus betulus* L., cultivée pour faire des enclos autour des jardins (Dk.) et à l'état spontané dans la forêt de *Tongerloo* (nob.) H. 4—5.
967. *Fagus sylvatica* L. cultivée partout et à l'état spontané dans les bois (Dk.) H. 4—5.
968. *Fagus castanea* L., cultivée, et à l'état spontané dans la forêt de *Tongerloo* (V. Bn.), H. 4—5.
969. *Juglans regia* L., cultivée (V. Bn.).
970. *Corylus avellana* L., croît partout dans les haies et les bois taillis (Dk.) H. 2—5.
971. *Platanus occidentalis* L., cultivé dans les avenues et les bois particuliers (Dk.) H. 5.
972. *Pinus sylvestris* L., partout dans les endroits sablonneux de la Campine et à *Brasschaet* (Dk.) H. 5.
973. *Pinus maritima* Mill., cultivé dans les endroits sablonneux et arides dans la Campine (nob.) H. 5.
974. *Pinus strobus* L., cultivé dans les bois particuliers (nob.) H. 5.
975. *Pinus larix* L. *Larix europæa* Decand., cultivé dans les bois de la Campine (nob.) H. 5—6.
976. *Pinus abies* L. *Abies excelsa* Poir., dans les bois de la Campine (Dk.) H. 5—6.

MONOËCIE SYNGÉNÉSIE.

957. *Bryonia dioïca* Jacq. *B. alba* Dek, *Stat. B. scarlatina* Dmtr., Prodrôm., dans les haies et les endroits incultes à *Heystopdenberg* (Dk.), aux alentours de l'abbaye de *Everbode* et sur les anciennes fortifications de Diest (nob.) 4. 6—9.

DIOËCIE DIANDRIE.

958. *Salix acuminata* Sm., les bords des fossés et les endroits humides dans la Campine (nob.) 4.
959. *Salix rufinervis* Decand., dans les bois incultes et humides aux environs de *Westerloo* (nob.) 4. 4—5.
960. *Salix capræa* L., dans les lieux sablonneux secs (Dk.) *δ. macrophylla* Scr., entre *Witryck* et *Contich* (nob.) 4.
961. *Salix cinera* L., les bois humides de la Campine (nob.) 4.
962. *Salix aurita* L., croît dans les bois humides (V. Bn.) 4.
963. *Salix incubacea* L., dans les lieux humides et incultes (V. Bn.) *δ. fusca* Dmtr., Prodrôm., dans la bruyère entre *Morkhoven* et *Tongerloo* (nob.) 4. 4—5.
964. *Salix viminalis* L., cultivé dans les endroits humides (Dk.) 4. 5—4.
965. *Salix seringiana* Gaud., dans les bois humides et les bords des ruisseaux dans la Campine (nob.) 4. 4—5.
966. *Salix amygdalina* L., croît dans les bois humides (V. Bn.) 4. 4—5.
967. *Salix vitellina* L., dans les endroits humides et spongieux (Dk.) 4. 5.
968. *Salix triandra* L., les bords des eaux près de la coupure à la *Tête de Flandre* et dans les prés entre *Mervem* et *Austruweel* (nob.) 4. 4—5.
969. *Salix alba* L., cultivé le long des fossés et des ruisseaux et contre la digue de l'Escaut entre *Austruweel* et le fort *Philippe* (Dk.) 4. 4—5.
970. *Salix babylonica* L., cultivé sur les bords des eaux dans les bois particuliers (nob.) 4. 5.
971. *Salix fragilis* L., dans les prés entre *Duffel* et *Waelthem* (Dk.) 4. 4—5.
972. *Salix russeliana* Sm., ? les endroits humides entre *Berchem* et *Deurne* (nob.) 4. 4—5.
973. *Salix depressa* Hoffm. *S. repens* L., sur les bords du canal *Napoléon* à *Herenthals* (Kx.) 4. 4—5.

DIOÉCIE DRIANDRIE.

974. *Empetrum nigrum* L. Cette belle espèce a été observée dans la bruyère aux environs de *Brasschaet* par M. Donkelaer père jardinier en chef du jardin botanique de Gand. 24. 5.

DIOÉCIE TÉTRANDRIE.

975. *Viscum album* L. Parasite sur les arbres (Dk.), très-rare aujourd'hui.  
976. *Myrica gale* L., les endroits humides dans les bruyères de la Campine (Dk.) entre *Herenthals* et *Gheel* (Kx.) et dans les environs du *Brecht* (nob.) H. 4—5,

DIOÉCIE PENTANDRIE.

977. *Canabis sativa* L., cultivé (V. Bn.).  
978. *Humulus lupulus* L., les bois taillis dans les endroits humides (Dk.) 24. 6—7.  
979. *Spinacea oleracea* L., cultivée (V. Bn.).

DIOÉCIE HEXANDRIE.

980. *Tamus communis* L., croît dans les bois ombragés (Dk.) très-rare 24. 5—6.

DIOÉCIE OCTANDRIE.

981. *Populus fastigata* Thuill. *P. dilatata* Ait. *P. italica* Manningh., cultivé le long des promenades et dans les bois particuliers (nob.) H. 4.  
982. *Populus tremula* L. *P. pendula* Dur., croît partout dans les bois de la Campine et dans les environs de *Brasschaet* (Dk.) H. 5—4.  
983. *Populus nigra* L., cultivée sur les bords des champs et dans les bois humides (Dk.) H. 5—4.  
984. *Populus canescens* Sm. *P. alba* Mill. non L., cultivé dans les bois et les terrains humides (V. Bn.) H. 4.  
985. *Populus alba* L. *P. major* Mill. *P. nivea* Willd., croît dans les mêmes localités (Dk.) H. 4—5.  
986. *Populus græca* Ait. *P. atheniensis* H. pur., cultivé dans les bois particuliers, et à l'état spontané entre *Berchem* et *Kiel* (nob.) H.  
987. *Populus canadensis* Burgsd. *P. monilifera* Ait., cultivé partout le long des rues et des champs dans la Campine (Dk.) H.

DIOÉCIE ENNÉANDRIE.

988. *Mercurialis perennis* L., croît dans les endroits ombragés et humides (Dk.), très-rare 2l. 4—5.  
 989. *Mercurialis annua* L., croît dans les champs et les jardins, commun partout (Dk.) ①. 7—10.  
 990. *Hydrochæris morsus rance* L., dans les eaux stagnantes aux environs de *Berchem*, *Borgerhout* et *Merxem* (Dk.) 2l. 6—8.

DIOÉCIE MONADELPHIE.

991. *Jniperus communis* L., croît dans les endroits arides des bruyères de la Campine et aux environs de *Brasschaet* (Dk.), 2l. 4—5.

DIOÉCIE SYNGÉNÉSIE.

992. *Ruscus aculeatus* L. (V. Bn.) cultivé dans les jardins particuliers.

POLYGAMIE MONOÉCIE.

993. *Holcus lanatus* L., dans les prés secs, et les bords des chemins (Dk.) 2l. 6—9.  
 994. *Holcus mollis* L., dans les champs, et aux alentours des bois (Dk.) 2l. 6—9.  
 995. *Arenatherum avenaceum* Beàuv. *Holcus avenaceus* Scop. *Avena elatior* L., dans les prés secs et surtout sur le glacis de la ville (Dk.) 2l. 5—8.  
 996. *Arenatherum bulbosum* Dmtr. *Avena bulbosa* Willd. *Avena elatior* β. L., croît dans les mêmes localités (nob.) 2l. 5—6.  
 997. *Acer pseudo-platanus* L., dans les bois de la Campine (Dk.) 2l. 4—5.  
 998. *Acer platanoïdes* L. (V. Bn.), cultivé dans les bois particuliers.  
 999. *Acer campestre* L., dans les bois taillis et les haies aux environs de *Witryck*, *Edegghem* et de *Contich* (Dk.) 1l. 5.  
 1000. *Parietaria erecta* Mert. et Koch. *P. officinalis* L. *Dek. Stat.*, croît aux pieds des murs aux alentours de l'abbaye de *Everbode* (nob.) 2l. 6—9.  
 1001. *Parietaria diffusa* Mert. et Koch. *P. officinalis* L., dans les fentes des vieux murs, hors la porte de *Slyk*, et dans ceux du pont de *Hessé* (nob.) 2l. 6—9.  
 1002. *Atriplex portulacoïdes* L., croît sur les bords de l'Escaut (Dk.) très-rare 2l. 6—8.  
 1003. *Atriplex patulum* L., les endroits incultes près des habitations (Dk.) ①. 7—9.

1004. *Atriplex angustifolium* Smith., dans les endroits incultes, près des habitations, dans la Campine (nob.) ①. 7—9.
1005. *Atriplex microspermum* W. et K., sur le glacis de la citadelle (nob.) ①. 7—8.
1006. *Atriplex flavescens* Dmtr. Prodrôm., croît pêle-mêle avec l'*Arundo phragmites* le long de l'Escaut, près d'Austruweel ①. 7—9.
1007. *Atriplex oblongifolium* Walr., sur le glacis de la citadelle pêle-mêle avec l'*A. microspermum* (nob.) ①. 7—8.
1008. *Atriplex littorale* L. *A. salicina* Gmel., croît sur les bords de l'Escaut près d'Austruweel (Manderlier) ①. 7—9.
1009. *Atriplex hastatum* L., croît dans les endroits incultes (Dk?) ①. 7—8.
1010. *Fraxinus excelsior* L. *F. apetalæ* Lam. fl. fr., croît partout dans les bois (Dk.) H. 4—5.

---

### Rapport sur le mémoire qui précède (1).

Messieurs,

Si de nos jours la botanique occupe le premier rang parmi les sciences naturelles, on en est redevable aux travaux des botanistes modernes, parmi lesquels un grand nombre appartient à l'art de guérir, car dans cette science encore, comme dans toutes les autres, nos collègues peuvent revendiquer une large part dans les découvertes qui ont signalé l'immense mouvement scientifique qui s'est opéré depuis la fin du siècle dernier. Dans notre pays cependant la botanique semble être de leur part, l'objet d'une prédilection toute spéciale. Voués par état à l'étude des sciences, plusieurs médecins, chirurgiens et pharmaciens trouvent dans leur séjour à la campagne, une occasion facile et continuelle pour se livrer à leur goût pour cette partie de l'histoire naturelle. M. Van Haesendonck est un de ceux qui s'y appliquent avec le plus d'ardeur et de succès. Sa position de chirurgien d'une de nos communes rurales a été mise à profit pour recueillir les matériaux nécessaires à la composition d'une Flore de la province d'Anvers, afin de compléter ce que MM. Dekin, Kickx, Van Beneden et Teurlinckx avaient ébauché avant lui:

Le travail qu'il vient de vous soumettre, renferme le nom botanique de 1010 plantes phanérogames qui croissent naturellement dans la province d'Anvers: parmi ce nombre se trouvent 210 espèces et 50 variétés de plantes

(1) MM. C. BROECKX, J.-J. MATTHYSSENS, commissaires, J. PYPERS, rapporteur.



qui ne figurent pas dans le catalogue de ses devanciers. Le nom botanique est assez généralement suivi du nom synonyme sous lequel ces plantes ont été désignées par l'un ou l'autre des botanographes les plus distingués. Nous avons vu avec plaisir que l'auteur ne s'est pas borné à une simple nomenclature, mais qu'il a eu l'heureuse idée d'indiquer le lieu où l'on trouve chaque plante, et l'époque de leur floraison. Cette disposition imprime à ce travail un cachet d'utilité qui sera apprécié par tous ceux qui s'occupent de botanique dans cette province et dont ils pourront tirer profit dans leurs herborisations.

Cependant, Messieurs, votre Commission regrette que l'auteur ait cru devoir disposer son travail d'après le système sexuel de Linnœus ; ce système tout artificiel et qui par sa facilité, peut être très-utile pour arriver promptement à la connaissance des plantes, a le grave inconvénient de disséminer dans des classes souvent très-éloignées les unes des autres les plantes qui ont cependant entre elles un air de famille bien caractérisé, tel est le cas pour les graminées, les labiées et autres groupes qui cependant constituent les familles les plus naturelles du règne végétal. Ce sont ces défauts inhérents à tout système artificiel, qui engagent de nos jours, les botanistes à n'admettre dans leurs ouvrages comme moyen de classification, que l'une ou l'autre des méthodes naturelles établies sur les bases posées par Jussieu. Cette méthode fondée, non sur la considération d'un seul organe, mais sur un grand nombre de rapports que les plantes présentent entre elles, est la seule philosophique, la seule qui puisse se maintenir à la hauteur de la science.

Nous eussions désiré également que M. Van Haesendonck y eût joint les cryptogames de notre province ; nous n'ignorons pas combien il est souvent difficile de déterminer l'espèce de ces plantes qui se trouvent placées si bas sur l'échelle de l'organisation végétale, mais nous savons aussi que ces difficultés sont en partie applanies pour l'auteur par suite des nombreux matériaux qu'il a déjà rassemblés pour cette partie de l'histoire naturelle.

Nous espérons que cette lacune sera comblée dans la Flore descriptive que nous annonce M. Van Haesendonck, et dont le présent travail ne constitue que le prodrome.

Votre Commission a jugé ce travail digne d'être inséré dans les Annales de la Société, et vous propose d'accorder à l'auteur le titre de membre correspondant.

Anvers, le 50 juillet 1841.

---



National Botanic Garden of BELGIUM, B-1860 Meise (BR)


LIBRARY  
Belgium & GDL



0 101800 403005

18  
**BEL**  
403





Belg

18

BEL

403

B

4